

LIBRARY  
OF  
A·S·HITCHCOCK  
AND  
AGNES·CHASE





Q1C  
73  
G32 H919  
1827  
t. 1  
Bot Hrc

4 m  
binding 3 m  
7 m

**HORTUS**


**REGIUS BOTANICUS  
BEROLINENSIS**

DESCRIPTUS

AB

***HENRICO FRIDERICO LINK,***

MED. ET PHIL. DR. MED. PROFESSORE P. O. IN UNIVERSITATE  
BEROLINENSI HORTI REGII BOTANICI BEROLIN. DIRECTORE  
REGI A CONSIL. MEDIC. INTIM. EQUITE ORDIN. AQUIL. RUBR.  
TERT. CL. ACADEMIAE BEROLINENS. ALIARUMQUE ACADEMIAR.  
ET. SOCIETAT. LITTERAR. SODALI.



**TOMUS I.**

---

**BEROLINI,  
APUD G. REIMER.**

**1 8 2 7.**

INVENTUS

RECIPIE BOTANICUS


RECOLLENTIS

DESCRIBITUS

AN

HENRICO LINDBERGO LINT

RECEIVED BY THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
FROM THE LIBRARY OF THE  
HARVARD HERBARIUM  
JAN 10 1892  
AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO



TOMUS I

RECOLLENTIS

RECIPIE BOTANICUS

INVENTUS

**V I R O**  
**ILLUSTRISSIMO, EXCELLENTISSIMO**  
**DOMINO**  
**LIBERO BARONI**  
**STEIN AB ALTENSTEIN**

**AUGUSTISSIMI ET POTENTISSIMI BORUSSORUM REGIS IN REBUS  
AD OMNEM ERUDITIONEM, DEI CULTUM ET MEDICINAM SPE-  
CTANTIBUS SUMMO MINISTRO, ORDINIS AQUILAE RUBRAE  
EQUITI PRIMARIO ETC. ETC.**

VIRGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DOMINGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

**Tibi, Vir Excellentissime!**

*opus hocce offero, REGIS Summo  
Ministro, qui sumtus Regios in  
Horti conservationem et augmentum,  
larga et sapienti manu distribuis,  
Tibi, Scientiarum rerum natura-  
lium et praesertim Botanices Peri-  
tissimo, cujus judicium in hisce re-*

*bus maximi facio, **Tibi** tandem, non  
solum gentis antiquissimae stirpe,  
sed quoque animi humanitate et mo-  
rum comitate Nobilissimo. Annue  
inceptis.*

---

## PRAEFATIO.

---

**I**n Enumeratione plantarum Horti Regii Botanici Berolinensis altera Berolini 1821 et 1822 edita, species plantarum in Horto cultas aut solis nominibus aut brevibus notis additis recensui. Nunc easdem differentiis specificis et genericis ex authopsia illustratas Botanices Peritis propono, non neglectis, quae post Enumerationem istam accepimus, praesertim nondum descriptis. Specie distinctas putavi plantas omnes facie diversas, de quibus non constat cultura mutatas esse; nec dubito plures cultura mutatas iri, sed facilius est species omittere non rite separatas, quam dirimere in unam conjunctas et confusas. Genera multa admisi et nova addidi, nam multo facilius est, speciem dignoscere, ubi plura distincta sunt genera characteribus certis, quam ubi pauca et magna, incerto modo distincta. Inflorescentiam in generibus Graminearum et Cyperoidearum distinguendis adhibui, nam notissimum est non nisi bracteas esse, quas Linnaeus calycem corrollamque nominavit,

ad inflorescentiam nec ad florem pertinentes. In Ordines naturales distribui plantas; dispositio enim plantarum in ordines naturales manuductio est ad veram plantarum cognitionem. Characteres vero ordinum naturalium certos firmosque eruere studui, nam absque his systema naturale mancum est, et systemate artificiali carere nequit. Auctores paucos citavi nec nisi qui descriptionem aut iconem habent, horumque libros signis artis peritis sat notis indicavi, moneo tantum R. S. significare Roemeri et Schultesii systema Vegetabilium, m. eorundem mantissam, W. E. Willdenowi Enumerationem plantarum Horti Berolinensis, W. E. S. ejusdem Enumerationis Supplementum, E. a. Enumerationem plantarum Horti Berolinensis meam, alteram post Willdenowianam dictam. Patriam addidi paullo accuratius, ubi licuit, indicatam. C. uti in Enumeratione Willdenowiana significat, plantam in Caldario esse colendam, T. in Tepidario, F. in Frigidario, D. sub Dio. Vale, Lector benevole, Horto Nobisque fave.

---

---

Classis I.

ENDOGENEAE.

Divisio I.

PARALLELINERVIAE.

---

Ordo I.

GRAMINEAE.

---

*Caulis* nodis integris clausis protuberantibus. *Folia* vaginata, vagina soluta. *Perigonium externum* (gluma) e bracteis vaginaceis (valvis) duabus alternis interdum valva deficit. *Perigonium internum* (glumella) e bracteis vaginaceis (valvulis) duabus alter-

*Link hortus I.*

A

nis facie oppositis; interdum valvula deficit. *Parapetala* 2 — 3. *Stamina* 3 aut 6, rarius 2 et 1. *Styli* 1 aut 2, rarius 3. *Seminium* e peridio cum semine arcte connato; embryo extra albumen, intra vitellum.

---

## Sectio I.

# SPICATAE TERMINALES.

*Inflorescentia* spicata aut racemosa terminans (caulem) monoclina. *Spiculae* uni-multiflorae villis non cinctae. Flosculi structura similes.

---

## Familia I. OPHIURINAE.

*Inflorescentia* rachi non dentata. *Spiculae* racheos excavationibus inclusae.

---

### 1. OPHIURUS.

*Spiculae* uniflorae rarius biflorae. *Gluma* bivalvis, rarius univalvis, *valvae laterales*, *flosculo longiores*. *Glumella* bivalvis, *valvulae subaequales muticae*. *Parapetala* lanceolata acuta. *Styli* penicillares.

Genus naturale, quamvis *valvae* interdum in unam connatae, et flos alter saepius deficiat.

#### 1. O. SUBULATUS.

Folia sulcata scaberrima. Spica incurva. *Valva unica* acuta nervosa adpressa. *Valvulae* membranaceae, ext. acuta.

*Lepturus cylindricus* Trin. agr. 123. *Monerma subulata* Beauv. R. S. 2. 799. m. 440. *Rottboella cylindrica* W. sp. 1. 464. Hab. in Europa australi. ☉. T.

## 2. O. INCURVATUS.

Folia striata scaberrima. Spica flexuosa attenuata. Valvae duae nervosae longe attenuatae subaristatae Valvulae membranaceae, exterior acuta.

*O. incurvatus* Beauv. R. S. 2. 797. m. 2. 440. *E. a.* 1. 101. *Rottboella incurvata* Linn. suppl. W. E. 129. *Host* gr. 1. 18. t. 23. Hab. in maritimis Europae australis occidentalis et Africae borealis. ☉. T.

## 3. O. FILIFORMIS.

Folia *filiformia*. Spica recta tenuis. Valvae 2 nervosae acutae. Valvulae membranaceae, exterior acuta.

*O. filiformis* Beauv. R. S. 2. 797. m. 2. 440. *E. a.* 1. 101. *Rottboella filiformis* W. E. 129. Hab. in Europa australi. 4. D.

## 4. O. PANNONICUS.

Folia striata scabra. Spica rectiuscula, *spiculae biflorae*. Valvae 2 nervosae acutae. Valvulae membranaceae exterior acuta.

*O. pannonicus* Beauv. R. S. 2. 798. m. 2. 440. *E. a.* 1. 101. *Rottboella pannonica*. W. E. 129. *Host* gr. 1. 19. t. 24. *Rottboella biflora* Roth. Pers. syn. 1. 130. *Rottboella salina* Spreng. *Host* 1. *Nachtrag* 1801. n. 45. Hab. in Europa australi praesertim orientali. ☉. T.

---

## 2. PSILURUS.

*Spiculae* uniflorae cum rudimento secundi floris; rarius biflorae. *Gluma* uni-bivalvis, *valvae laterales, flosculo multo breviores. Glumella* bivalvis, valvula exterior interdum ex apice *aristata. Parapetala* 2 germinis fere longitudine.

*Styli* penicillares.

In eadem planta *spiculae* uniflorae et biflorae, *gluma* univalvis et bivalvis. *Pedicellus* rachi adnatus decurrens sub flore articulatus.

## 5. PS. NARDOIDES.

Folia filiformia. Spica tenuissima flexuosa, spiculis adpressis. Valvula exterior ex apice aristata.

*Ps. nardoides Trin. agrost.* 93. *Monerma monandra Beauv. R. S.* 2. 7. 99. *m.* 2. 440. *Rottboella monandra Schrad. germ.* 1. 413. *W. E.* 129. *E. a.* 1. 101. *Nardus aristata Linn. W. sp.* 1. 315. *Asperella nardiformis Host gr.* 4. 17. *t.* 29. Hab. in Europa meridionali. 2. D.

## 3. LODICULARIA.

*Spiculae* biflorae et subbiflorae, *flosculo* altero masculino aut neutro, rachi aversae. *Gluma* bivalvis, *valvae facie oppositae*, interior in excavatione racheos. *Glumella* flosculi hermaphroditi bivalvis, valvula exteriore majore, flosculi masculi aut neutrius uni-bivalvis; valvulae muticae. *Parapetala* majuscula dentata membranacea. *Styli* penicillares.

## 6. L. FASCICULATA.

Caulis ramosissimus. Spica quadrifariam imbricatâ. Valvae nervosae oblique carinatae. Valvula flosculi neutrius reliquis major, valvula exterior flosculi hermaphroditi interiore duplo major, omnes membranaceae.

L. fasciculata *P. Beauvois agr.* 108. t. 11. f. 6.  
 Rottboella fasciculata *Desfont. atl.* 1. 110. t. 36. R.  
*S.* 2. 787. *m.* 2. 432. R. spathacea *Tenore mspt.*  
 Hab. in Europa australi et Africa boreali. 4. T.

## ISCHAEMUM.

v. i.

## Fam. II. LOLIACEAE.

*Inflorescentia* spicata, rachi non dentata. *Spiculae* racheos excavationibus non inclusae.

## 4. LOLIUM.

*Spiculae* multiflorae rachi aversae. *Bractea* *spiculam basi amplexans*. *Gluma* bivalvis, valvae 2 laterales, saepe deficientes. *Glumella* bivalvis, valvulae subaequales, valvula exterior saepe sub apice aristata. *Callus* sub flosculo in squamulas duas oppositas abiens. *Parapetala* ovalia gibba acutiuscula. *Styli* plumosi.

Valvula interior tenae et dense ciliata.

## 7. L. TEMULENTUM.

Caulis superne scaber. Bractea spicula longior. Valvae flosculo inferiore breviores lanceolatae obtu-

siusculae. Valvula exterior aristata, arista firma valvula longior, int. subinclusa.

*L. temulentum.* *Linn. W. sp.* 1. 461. *W. E.* 129. *E. a.* 1. 98. *R. S.* 2. 749. *m.* 2. 408. *Schreb. gr.* 2. 74. *t.* 36. *Host gr.* 1. 23. *t.* 29. Hab. in agris inter segetes Europae. ☉. D.

#### 8. L. SPECIOSUM.

Caulis scaber. Bractea spicula longior. Valvae flosculo inferiore breviores lanceolatae obtusiusculae. Valvula exterior acutiuscula arista sub apice tenerima valvulae aequalis, interdum brevis aut deficiens.

*L. speciosum.* *Steven Marsch. t. c.* 1. 80. 3. 89. *E. a.* 1. 98. *R. S.* 2. 750. *m.* 2. 408. Hab. in Tauria, Iberia. ☉. D.

#### 9. L. ARVENSE.

Caulis laevis. Bractea spiculam aequans. Valvae nullae. Valvula exterior obtusiuscula mutica aut tenuissime aristulata.

*L. arveuse.* *Withering Schrad. germ.* 1. 399. *W. E.* 129. *E. a.* 1. 98. *R. S.* 2. 748. *Host gr.* 3. 17. *t.* 25. *Marsch. t. c.* 3. 89. Hab. in Europae mediae et Asiae adjacentis arvis. ☉. D.

#### 10. L. COMPLANATUM.

Caulis superne scaber. Bractea spiculam aequans. Valvae nullae. Valvula exterior obtusiuscula mutica.

*L. complanatum.* *Schrad. N. Journ. d. Bot.* 4. 73. *E. a.* 1. 98. *L. rigidum Gaudin agr.* 1. 334. *R. S.* 2. 749. *m.* 2. 408. *L. asperum Hortul.* Hab. in Helvetia australi ad vias. ☉. D.

## 11. L. PERENNE.

Caulis laevis. Bractea spicula brevior. Valvae nullae. Valvula ext. obtusiuscula mutica rarius subaristulata.

L. perenne. *Linn. W. E.* 128. *E. a.* 1. 98. *R. S.* 2. 748. *m.* 2. 407. *Schreb. gr.* 2. 79. *t.* 37. *Host gr.* 1. 20. *t.* 25. Hab. frequens per totam Europam praesertim mediam et borealem. 4. D.

---

## Fam. III. ZOYSINAE.

*Inflorescentia* subspicata pedicellis subadnatis sub flore articulatis.

## ZOYSIA.

*Spiculae* uniflorae. *Gluma* bivalvis, valva exterior complicata basi connata carinata cartilaginea; interior non minus complicata carinata at membranacea. *Glumella* nulla. *Parapetala* nulla.

Valva interior mihi ad glumam pertinere videtur, cum ejus carina opposita sit carinae valvae exterioris. Tertiam valvam aut valvulam, quam R. Brown indicat, non video.

## Z. PUNGENS.

Folia disticha convoluta breviter pungentia ad oras vaginae villosa. Spica brevis rachi flexuosa. Valva ext. obtusiuscula laevissima.

Z. pungens. *Willd. N. Act. amic. berol.* 3. 442. *R. Brown pr.* 1. 208. *R. S.* 2. 265. *m.* 2. 152. *Agrostis Matrella Linn. W. sp.* 1. 366. *Roxb. ind.* 1. 309. Hab. in India orientali et N. Hollandia.

---

## Fam. IV. NARDINAE.

*Inflorescentia* spicata, rachi dentata. *Spiculae* uniflorae. *Stylus* 1. simplex.

---

## 5. NARDUS.

*Gluma* nulla. *Glumella* bivalvis, valvula exterior marginibus complectens alteram planam. *Stylus* pilosus.

## 12. N. STRICTA.

Folia convoluta. *Spiculae* secundae. Valvula exterior longe subulata scabra.

N. stricta. *Linn. W. E.* 80. *E. a.* 1. 40. *R. S.* 2. 263. *m.* 2. 151. *Schreb. gram.* 1. 65. *t.* 7. *Host gram.* 2. 4. *t.* 4. Hab. in Europae borealis et frigidioris arenosis turfosis. 24. D.

---

## Fam. V. CENCHRINAE.

*Inflorescentia* spicata, rachi subdentata. *Involucrum* flosculos includens.

---

## 6. CENCHRUS.

*Involucrum* monophyllum, extus *spinis accretis*, tandem induratum, includens spiculam unam pluresve. *Spiculae* biflorae, flosculus alter hermaphroditus alter masculus. *Gluma* bivalvis, flosculis aequalis. *Glumella* bivalvis, valvae muticae. *St.* 1. bipartitus, laciniae penicillares.

Rachis dentata, pedicelli brevissimi.

## 13. C. ECHINATUS.

Folia vagina glabra, ligulae loco pili. Involucrum *partitum* hirsutum *spinis arrectis*. Spiculae tres.

C. echinatus *Linn. W. E.* 43. *E. a.* 1. 40. *R. S.* 2. 253. *m.* 2. 145. *Schreb. gram.* 2. 9. *t.* 23. *f.* 1. Hab. in insulis Caribaeis, Cumana, Essequibo. ☉. T.

## 14. C. SPINIFEX.

Folia vagina ore et margine pilosa, ligulae loco pili. Involucrum *partitum* hirsutum *spinis divaricatis*. Spiculae tres.

C. spinifex *Cavan. ic.* 5. 38. *t.* 461. *Pers.* 1. 71. Hab. in Chile et Buenos-Ayres. ☉. T. Confunditur cum C. echinato et tribuloide *R. S.* 2. 253. sed ab utroque satis distinctus.

## 15. C. TRIBULOIDES.

Folia vagina margine lanato, ligulae loco pili. Involucrum *integrum* villosum. Spicula unica.

C. tribuloides *Linn. R. S.* 2. 253. *m.* 2. 145. *E. a.* 1. 40. Hab. in Americae borealis maritimis a New Jersey ad Floridam. ☉. T.

## 7. ANTHEPHORA.

*Involucrum* quadrifidum non spinosum, spiculas tres includens. Spiculae biflorae, flosculus alter hermaphroditus alter neuter. *Gluma* bivalvis, valvula exterior minor subulata. *Glumella* flosculi neutrius bivalvis, valvula ext. plana nervosa, interiore minore, hermaphrod. bivalvis, valvulae

planiusculae laeves cartilagineae. *Styli* penicillares.

Rachis vix dentata, pedicelli vix ulli.

#### 16. A. ELEGANS.

Spica flexuosa. Involucris laciniis basi patentes superne conniveates.

*A. elegans* Schreb. *gr.* 2. *t.* 44. *R. S.* 2. 497. *m.* 2. 282. *E. a.* 1. 101. *Tripsacum hermaphroditum* Linn. *W.* *sp.* 4. 202. *Colladoa monostachya*. *Pers. syn.* 1. 107. Hab. in India occidentali. ☉. D.

### Fam. VI. LAPPAGINEAE.

*Inflorescentia* racemosa. *Valva* interior firmior hamis obsita.

#### 8. LAPPAGO.

*Spiculae* uniflorae. *Gluma* bivalvis, valva exterior membranacea, interior nervosa, nervi hamis obsiti. *Glumella* bivalvis, valvulae convexae membranaceae muticae. *Parapetala* 2 lanceolata acuta. *Styli* 2 penicillares.

#### 17. L. RACEMOSA.

Folia aculeato-ciliata. Panicula ramulis brevissimis 3—5 floris. Valva exterior multo minor, interior glumella paullo major. Valvulae subaequales acutae.

*L. racemosa* *W. E.* 136. *E. a.* 1. 65. *Host gr.* 1. 28. *t.* 36. *Tragus racemosus*. *Haller. R. S.* 2. 378. *m.* 2. 205. *Cenchrus racemosus* Linn. *Schreb.*

*gram.* 1. 45. *t.* 4. *Cenchrus linearis* *De Cand. fr.* 3. 631. Hab. in arenosis Europae australis. ☉. T.

## Fam. VII. AEGILOPINAE.

*Inflorescentia* spicata, rachi dentata. *Valvae* collaterales.

### 9. AEGILOPS.

*Spiculae* multiflorae rachi adversae. *Gluma* bivalvis, *valvae laterales appositae*, flosculis aequalibus, aristis subbinis, binis pluribusque. *Glumella* bivalvis, exterior apice saepe aristata. *Parapetala* 2 lanceolata superne hirsutissima. *Styli* 2 plumosi.

### 18. A. OVATA.

*Spica* brevis, *spiculae* triflorae, flosculo summo sterili. *Valvae* truncato ovaes *multinerviae multiaristatae*. *Valvula* exterior triaristata.

*A. ovata.* *Linn. W. E.* 1039. *E. a.* 1. 101. *R. S.* 2. 771. *m.* 2. 422. *Host gr.* 2. 5. *t.* 5. Hab. in Europa australi. ☉. D. Variat foliis spiculisque glabris et hirsutis.

### 19. A. TRIUNCIALIS.

*Spica* longiuscula, *spiculae* subtriflorae, flosculo summo sterili. *Valvae* truncato-lanceolatae *multinerviae bi-triaristatae*, *summarum spicularum longiores*. *Valvula* exterior bi-triaristata.

*A. triuncialis* *Linn. R. S.* 2. 772. *m.* 2. 422. *Schreb. gr.* 1. 80. *t.* 10. *f.* 1. *Host gr.* 2. 6. *t.* 6. *A. triaristata* *W. sp.* 4. 943. *W. E.* 1039. *E. a.* 1.

101. *R. S.* 2. 777. *m.* 2. 422. Hab. in Europa australi. ☉. D. Variat foliis spiculisque glabris et hirsutis. *A. triuncialis* et *triaristata* non diversae videntur nec e Willdenowii herbario aliquid certi hac de se affirmari potest.

20. *A. CAUDATA.*

Spica elongata, spiculae subtriflorae, flosculo summo sterili. Valvae truncato-lanceolatae spicarum inferiorum subbiaristulatae aut biaristatae *aristis brevissimis, summorum biaristatae aristis longissimis*. Valvula exterior subbiaristata.

*A. caudata* *Linn. R. S.* 2. 770. *m.* 2. 422. *A. cylindrica* *Host gr.* 2. 6. *t.* 7. *R. S.* 2. 770. *m.* 2. 422. *W. E.* 1039. *E. a.* 1. 101. Hab. in Europa australi. ☉. D. *A. caudata* ab *A. cylindrica* non differt, numerus enim aristarum in una eademque stirpe variat.

21. *A. SQUARROSA.*

Spica elongata, spiculae triflorae flosculo summo sterili. Valvae truncato-ovales subbiaristatae. Valvula exterior apice truncato e carina longe aristata, aristae in *spiculis summis longissimae*.

*A. squarrosa*. *Linn. W. sp.* 4. 944. *W. E.* 1039. *E. a.* 1. 101. *Schreb. gr.* 2. 44. *t.* 27. *f.* 2. *Triticum Aegilops* *R. S.* 2. 769. *m.* 2. 421. Hab. in Oriente, Iberia. ☉. D.

---

## Fam. VIII. HORDEACEAE.

*Inflorescentia* spicata, rachi dentata. *Gluma* a glumella sejuncta, rarius nulla.

---

## 10. ASPRELLA.

*Spiculae* multiflorae geminae. *Gluma nulla*. *Glumella* bivalvis, valvula exterior ex apice aristata. *Parapetala* ovalia lata inaequalia hinc acuta. *Styli* plumosi.

Asprellae nomen Humboldtius ante Hostium introduxit.

## 22. A. HYSTRIX.

Spica erecta, spicula altera 3 flora, altera 4 flora, pedicello articulato. Valvula exterior laeviuscula, aristata valvula longior.

A. Hystrix *Humboldt Uster. Magaz. W. E.* 132. *E. a.* 1. 100. *Elymus Hystrix Linn. W. sp.* 1. 471. *Jacq. ic.* 2. *t.* 305. *R. S.* 2. 779. *m.* 2. 427. Hab. in Oriente. 4. D. Pedicellus articulatus a glumae rudimentis.

## 11. ELYMUS.

*Spiculae* geminae, ternae, quaternaeve multiflorae aut subbiflorae. *Gluma* bivalvis, valvae spiculam aequantes aut ipsa breviores. *Glumella* bivalvis valvula exterior saepe ex apice aristata. *Parapetala* obtusa superne saepe ciliata. *Styli* 2 plumosi. Gluma pedicellata, saepe pedicello e duabus valvis connato.

*Subgen. 1. Genuini:* Spiculae multiflorae. Germen villosum.

## 23. E. ARENARIUS.

Folia convoluta rigida. Spica erecta, spiculae geminae 4—6 florum. Valvae acutatae ciliatae spiculam subaequantes. Valvula exterior acutata pilosa.

*E. arenarius* Linn. *W. E.* 130. *E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 773. *m.* 2. 424. *Schreb. gr.* 2. 85. *t. Host gr.* 4. 7. *t.* 12. Hab. in Europae borealis et mediae arenosis maritimis. 24. D.

24. *E. GENICULATUS.*

Caulis demum *superne inflexus*. Folia *convoluta rigida*. Spica erecta. Valvae acutatae ciliatae spiculam subaequant. Valvula exterior acutata *pilosa*.

*E. geniculatus* Curt. *W. E.* 130. *E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 774. *m.* 2. 424. Hab. In littoribus maritimis Angliae prope Gravesend. 24. D.

25. *E. SABULOSUS.*

Folia *plana demum involuta*. Spiculae quaternae 2—4 florum. Valvae aristatae glabrae scabro-ciliatae spicula longiores. Valvula exterior acutiuscula *pilosa superne glabrescens*. *E. sabulosus* Marsch. *t. c.* 1. 81. 3. 90. *W. E.* 130. *E. a.* 1. 199. *R. S.* 2. 774. *m.* 2. 424. Hab. in arena mobili Tauriae et ad Caucasum. 24. D. *E. giganteus* *W. E.* 130. *E. a.* 1. 99. ab hac specie nullo modo differt, nam spiculas magis minusve patentes esse, fallacem praebet characterem, nec vidi *E. giganteum* ab *E. sabuloso* diversum.

26. *E. SIBIRICUS.*

*Spica nutans*, spiculae inferiores geminae 6—8-florae. Valvae acutatae et aristatae flosculis inferioribus breviores. Valvula ext. *scabro-pilosa* longe aristata.

*E. sibiricus* Linn. *W. E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 775. *m.* 2. 775. *Schreb. gr.* 2. 1. *t. t.* 21. *f.* 1. *E. tener*

*Linn. W. E. 1. 131. R. S. 2. 775. Hab. in Sibiria. 24. D. E. tener ab E. sibirico certe non differt.*

### 27. E. CANADENSIS.

*Spica erectiuscula, spiculae binae ternaeve 2—4 florum. Valvae longe aristatae flosculos inferiores aequantes. Valvula exterior scabro-pilosa longe aristata.*

*E. canadensis Linn. W. E. 131. E. a. 1. 99. R. S. 2. 776. m. 2. 425. E. philadelphicus Linn. W. E. 131. E. a. 1. 99. R. S. 2. 755. m. 2. 424. Hab. in America boreali. 24. D. Repetita observatione nullum verum discrimen inter. E. canadensem et philadelphicum iuvenio.*

### 28. E. GLAUCIFOLIUS.

*Herba glauca. Spica erectiuscula, spiculae binae ternaeve 2—4 florum. Valvae longe aristatae flosculos inferiores subaequantes scabro-ciliatae. Valvula exterior scabro-pilosa longe aristata.*

*E. glaucifolius Mühlenb. W. E. 131. E. a. 1. 99. R. S. 2. 776. m. 2. 425. In siccis Virginiae et Pennsylvaniae. 24. D. Nonnisi colore glauco a praecedente differt. Flosculorum numerus in utroque variat.*

### 29. E. VILLOSUS.

*Spica erecta, spiculae binae ternaeve 2—4 florum. Valvae longe aristatae flosculos inferiores subaequantes pilis sparsis. Valvula exterior pilis patulis, longe aristata.*

*E. villosus Mühlenb. W. E. 131. E. a. 1. 99. R. S. 2. 776. m. 2. 425. Hab. in aridis petrosis Virginia*

giniae et Pennsylvaniae. 2. D. Tres species: canadensis, glaucifolus, villosus valde affines.

## 30. E. VIRGINICUS.

Spica *erecta* densa, spiculae binae ternaeve 2—4-florae. Valvae longe aristatae flosculis inferioribus parum breviores glabrae. Valvula exterior *scabra ciliata* longe aristata.

E. virginicus. Linn. *W. E.* 131. *E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 776. *m.* 2. 425. Hab. in montosis Europae borealis. 2. D. Differt a praeceidentibus spica densa, aristis brevioribus. Spica plerumque vagina folii superioris inclusa.

## 31. E. STRIATUS.

Spica *erecta*, spiculae geminae subbiflorae. Valvae longe aristatae flosculis parum breviores *nervosae*. Valvula exterior longe aristata *glabra*; aristae patentiusculae.

E. striatus. *W. sp.* 1. 470. *W. E.* 131. *E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 777. *m.* 2. 426. Hab. in umbrosis Pennsylvaniae, Virginiae. 2. D. Flosculus alter spiculae saepe neuter.

## 32. E. EUROPAEUS.

Spica *erecta*, spiculae geminae subbiflorae. Valvae longe aristatae flosculis parum breviores *enerviae*. Valvula exterior longe aristata *glabra*; aristae arrectae.

E. europaeus. Linn. *W. E.* 132. *E. a.* 1. 99. *R. S.* 2. 777. *m.* 2. 426. *Host gr.* 1. 22. *t.* 28. Hab. in Europae mediae nemoribus. 2. D. Flosculus alter spiculae saepe mutilus.

*Subgen. 2. Medusini.* Spiculae subbiflorae, flosculo altero mutilo. Germen glabrum.

## ✓ 33. E. PLATATHERUS.

Spica erectiuscula, spiculae geminae subbiflorae. Valvae *basi arrectae*, superne patentes longe aristatae flosculis breviores, aristae angustiores. Valvula exterior longissime aristata *laevis glabra*, aristae latae. Hab. in Aegypto. ☉. T. Ehrenberg.

Caulis 2 ped. altus laevis. Folia laevia ligula brevissima. Valvae inferiorum cum aristis breviores, superiorum longiores poll. et 4 lin. longae, angustae vix lin. latae margine scabrae. Valvula exterior 6 lin. longa laevissima, arista ultra 3 poll. longa lin. lata margine scabra. Affinis aequanti, differt magnitudine et valvula laevi, aristis latioribus.

## 34. E. CRINITUS.

Spica erectiuscula, spiculae geminae subbiflorae. Valvae *basi arrectae* superne patentes longe aristatae flosculis breviores, aristae tenuiores. Valvula exterior longissime aristata *scabro-pilosa*, aristae patulae latiusculae.

E. crinitus. *Schreb. gr. 2. 15. t. 24. f. 1. Host gr. 1. 21. t. 27. R. S. 2. 177. m. 2. 427. Marsch. t. c. 3. 91. E. intermedius Hornem. hafn. 954. Marsch. t. c. 1. 82. R. S. 2. 779. m. 2. 427. Hab. in Iberia. ☉. D. Valvae cum aristis poll. longae. Valvula exterior 4 lin. longa, arista 2 poll. longa dimid. lin. lata.*

## 35. E. CAPUT MEDUSAE.

Spica erectiuscula, spiculae geminae subbiflorae. Valvae *basi divaricatae* longe aristatae flosculis breviores aristis tenuioribus. Valvula exterior longissime aristata *glabra scabriuscula*, aristae patulae latiusculae.

E. Caput Medusae. *Linn. W. E.* 130. *E. a.* 1. 100. *R. S.* 2. 770. *m.* 2. 427. *Schreb. gr.* 1. 17. *t.* 24. *f.* 2. Hab. in Hispania et Lusitania. ☉. T. Valvula exterior arista ad 5 poll. longa dimid. lin. lata.

## 36. E. JUBATUS.

Spica erectiuscula, spiculae geminae subbiflorae. Valvae *basi arrectae* superne patentes longe aristatae flosculis breviores. Valvula exterior longissime aristata, *aristae tenuissimae* scaberrimae.

Hordeum jubatum Linn? *W. sp.* 1. 476. *R. S.* 2. 792. *m.* 2. 436. exclus. synonym. Muehlenb. et Pursh. Hab. . . . ? ☉. D. Nomine Hordei jubati jam dudum in hortis cultum, aristis tenuissimis sericeo splendore distinctum. Praecedentibus affinis.

## 12. HORDEUM.

*Spiculae ternae geminaeve uniflorae. Gluma* bivalvis. *Glumella* bivalvis valvula exterior ex apice aristata. *Parapetala* obtusa apice ciliata. *Styli* plumosi. *Germen* superne villosum. Gluma saepe sessilis interdum pedicellata.

## 37. H. VULGARE.

Spica inaequaliter hexasticha, *flosculis arrectis, omnibus fertilibus*. Valvae aristis brevioribus. Valvula exterior arista longissima.

A. *Vulgatum*. Valvula ext. flavescens. Seminium glumella conclusum.

H. vulgare. *Linn. W. E.* 1037. *E. a.* 1. 100. *R. S.* 2. 791. *m.* 2. 435. *Host gr.* 3. 23. *t.* 34. Hab. . . . ☉. D. Valvae pilosae.

*B. Coeleste.* Valvula ext. flavescens. Seminium liberum.

*H. coeleste Viborg. R. S. m. 2. 435. H. vulgare coeleste Linn. R. S. 2. 791. Hab. . . . ☉. D.*

*C. Nigrum.* Valvula exterior nigrescens. Seminium glumella conclusum.

*H. nigrum W. E. 1037. E. a. 1. 100. R. S. 2. 791. m. 2. 435. Hab. . . . ☉. D.* Caulis adscendens, Serius maturescit quam *H. vulgare*. Autumno satum, multos stolones vere emittit.

### 38. *H. HEXASTICHON.*

Spica exacte hexasticha, rarius tetrasticha, *flosculis patentibus, omnibus fertilibus*. Valvae aristis brevioribus. Valvula exterior arista longissima. Seminium glumella corticatum.

*H. hexastichon Linn. W. E. 1038. E. a. 1. 100. R. S. 2. 791. m. 2. 436. Host gr. 3. 24. t. 35. Hab. . . . ♂. D.*

### 39. *H. DISTICHON.*

Spica exacte hexasticha flosculis *lateralibus masculis adpressis muticis, fertilibus arrectis*. Valvae inferne pilosae, aristis brevibus. Valvula exterior fertilium arista longissima, masculorum obtusiuscula. Seminium glumella corticatum.

*A. Vulgatum.* Semen glumella conclusum.

*H. distichon. Linn. W. E. 1. 1038. E. a. 1. 100. R. S. 2. 793. m. 2. 437. Host gr. 3. 25. t. 36. Hab. . . . ☉. D.*

*B. Nudum.* Seminium liberum.

*H. nudum. Arduin R. S. m. 2, 437. H. distichon nudum. R. S. 2. 793. Hab. . . . ☉. D.*

## 40. H. ZEOCRITON.

Spica exacte hexasticha, flosculis *lateralibus adpressis masculis muticis, fertilibus patentibus*. Valvae aristis brevibus. Valvula exterior fertilium arista longissima, masculorum obtusiuscula. Seminium glumella corticatum.

H. Zeocriton. *Linn. W. E.* 1038. *E. a.* 1. 100. *R. S.* 2. 793. *m.* 2. 437. *Schreb. gr.* 1. 125. *t.* 17. *Host gr.* 3. 26. *t.* 37. Hab. . . . ☉ ♂. D.

## 41. H. STRICTUM.

Caulis *basi bulbescens*. Spica hexasticha, flosculis *lateralibus masculis muticis, fertilibus adpressis*. Valvae aristis brevioribus. Valvula exterior fertilium longe aristata, masculorum acutata.

H. strictum, *Desfont.* 1. 113. *t.* 37. *R. S.* 2. 792. *m.* 2. 437. H. bulbosum *Sibth. gr.* 1. 79. *t.* 98. *Smith prodr. gr.* 1. 73. *Marsch. t. c.* 1. 82. 3. 91. *Host gr.* 4. 8. *t.* 13. *R. S.* 2. 792. *m.* 2. 436. *E. a.* 1. 100. H. nodosum *Savi 2 Cent.* 37. Hab. in Europa australi et Africa boreali. 4. D.

## 42. H. PRATENSE.

Spica hexasticha, flosculis *lateralibus masculis aristatis*. Valvae aristis brevioribus *basi strictis scabris*. Valva exterior longius aristata. Seminium glumella corticatum.

H. pratense. *Huds. Schrad. germ.* 1. 405. *R. S.* 2. 794. *m.* 2. 438. H. secalinum *W. sp.* 1. 478. *W. E.* 1038. *E. a.* 1. 100. *Host gr.* 1. 26. *t.* 33. Hab. frequens in pratis Europae mediae. 4. D.

## 43. H. MURINUM.

Spica hexasticha, flosculis lateralibus *masculis aristatis*. Valvae aristis brevioribus basi strictis *ciliatis*. Valva exterior longius aristata. Seminium glumella corticatum.

H. murinum. *Linn. W. E.* 1038. *E. a.* 1. 100. *R. S.* 2, 793. *m.* 2. 438. *Host gr.* 1. 25. *t.* 32. Hab. frequens per totam Europam ad vias. 4. D.

## 44. H. MARITIMUM.

Spica hexasticha, flosculis lateralibus *masculis aristatis*. Valvae aristis brevioribus *basi divaricatis scabris*. Valvula exterior longius aristata. Seminium glumella corticatum.

H. maritimum. *Wither. W. E.* 1038. *E. a.* 1. 100. *R. S.* 2. 795. *m.* 2. 438. *Host gr.* 1. 27. *t.* 34. H. rigidum *Roth catal.* 1. 24. H. Hystrix *Roth catal.* 1. 23. non differre videtur. Hab. in Europae maritimis. ☉. D.

## Fam. IX. TRITICEAE.

*Inflorescentia* spicata et subracemosa, rachi plerumque dentata. *Gluma* glumellam utrinque amplexens.

## 13. SECALE.

*Inflorescentia* spicata, rachi excisa. *Spiculae* biflorae rachi adversae. *Gluma* bivalvis, valvae flosculis breviores angustissimae. *Glumella* bivalvis, exterior apice longe aristata. *Parapetala* 2 obtusa apice pilosa basi gibba. *Styli* plumosi. *Germen* apice pilosum.

## 45. S. CEREALE.

*Spica ad articulos haud secedens*, spiculae dense approximatae. Valvae angustissimae longe acutatae. Valvula exterior superne nervosa longe aristata ciliata.

S. cereale *Linn. W. E.* 132. *E. a.* 1. 98. *R. S.* 2. *m.* 2. 773. *m.* 2. 423. *Host gr.* 2. 35. *t.* 48. Hab....  
 ☉. D. Sequenti valde affine, an cultura mutatum?

## 46. S. FRAGILE.

*Spica longiuscula ad articulos secedens*, spiculae dense approximatae. Valvae angustae apice aristatae. Valvula exterior superne nervosa longe aristata ciliata.

S. fragile. *Marsch. t. c.* 3. 93. *E. a.* 1. 98. *R. S. m.* 2. 423. *Secale sylvestre Host gr.* 4. 7. *t.* 11. Hab. in Europa australi orientali. ☉. D.

## 14. TRITICUM.

*Inflorescentia spicata, rachi excissa. Spiculae multiflorae* rachi adversae. *Flosculi inferiores 2—3 fertiles superiores 1—2 steriles. Gluma bivalvis*, valvae flosculis inferioribus plerumque breviores. *Glumella bivalvis exterior apice saepe aristata. Parapetala 2 obtusa*, apice semper pilosa. *Styli plumosi. Germen apice villosum.*

Triticum, Agropyrum et Secale unum idemque genus naturale constituunt. Cum vero numerus specierum sat magnus sit, genera plura artificialia constituere licit.

## 47. TR. VULGARE.

*Spiculae remotiusculae. Valvae aristatae su-*

*perne carinatae*. Valvula exterior aristata muticave.  
Seminium oblongum liberum.

A. *Albens*. Valvula ext. aristata glabra ant velutina albeus.

Tr. vulgare. *Host gr.* 3. 18. t. 26. Tr. vulgare.  
A et B. *Sering. mel.* 87. 89. *Metzger eur. cereal.* 1.  
Tr. aestivum. *Linn. sp.* 1. 126. *R. S.* 2. 4. 762.  
*Var. h. a.*

B. *Rubescens*. Valvula ext. aristata glabra aut velutina rufa.

Tr. vulgare C et D. *Seringe mel.* 8. *Metzg. cer.* 3. Tr. aestivum. *h. b.* *R. S.* 2. 762.

C. *Fuscescens*. Valvula ext. aristata, glabra, fusca.

Tr. vulgare E. *Metzg. cer.* 4. *Schübler Diss.* 12.  
*Fuchsweizen germ.*

D. *Nigrescens*. Valvula ext. aristata glabra nigrescens.

Tr. vulgare G. *Metzg. cer.* 5.

E. *Album*. Valvula ext. mutica glabra alba.

Tr. vulgare H et I. *Metzg. cer.* 5. Tr. vulgare  
E. *Sering. mel.* 90. Tr. muticum var. a. *Schübl. Diss.* 10. Tr. aestivum c. b. *R. S.* 2. 762.

F. *Aureum*. Valvula ext. mutica glabra alba, seminibus aureis.

Tr. vulgare R. *Metzg. cer.* 6.

G. *Album velutinum*. Valvula ext. mutica velutina alba.

Tr. vulgare F. *Sering. mel.* 92. *R. S.* 2. 762.  
Tr. vulgare L. *Metzg. cer.* 7. Tr. velutinum. *Schübl. Diss.* 13. *R. S. n.* 2. 413. *Böhmischer Weizen germ.*

H. *Rufum*. Valv. ext. mutica glabra rufa.

Tr. vulgare N. *Metzg. cer.* 8. Tr. vulgare G. *Sering. mel.* 91. Tr. vulgare *Host gr.* 3. 18. *t.* 26. fig. alt. Tr. aestivum b. *R. S.* 2. 762. Tr. muticum hybernum *Schübl. Diss.* 16. Tr. hybernum *Linn. sp.* 1. 126.

Hab. . . . ☉. ♂. D.

I. *Rufum velutinum.* Valvula ext. mutica rubra velutina.

Tr. vulgare O. *Metzg. cer.* 9. Tr. vulgare H. *Sering. mel.* 94.

K. *Subtile.* Caulis tenuissimus. Spica pauciflora. Valvae longe aristatae. Valvula ext. longissime aristata glabra albens.

Colitur in Italia ad pileos foeminarum e caulibus conficiendos.

#### 48. TR. COMPACTUM.

Spiculae *dense approximatae.* Valvae *aristatae superne carinatae.* Valvula ext. aristata muticave. Seminium oblongum *liberum.*

A. *Aureum.* Valvula ext. aristata glabra alba, seminiis aureis.

Tr. compactum. *Host gr.* 4. 4. *t.* 7. *Schübl. Diss.* 15. *R. S.* 2. 765. *m.* 2. 416. Tr. vulgare P. *Metzg. cer.* 10. Tr. vulgare I. *Sering. mel.* 94.

B. *Album.* Valvula ext. aristata glabra, seminiis albidis.

T. vulgare Q. *Metzg. cereal.* 10.

C. *Album velutinum.* Valvula ext. aristata velutina, seminiis albidis.

Tr. vulgare R. *Metzg. cer.* 11.

D. *Rufum.* Valvula ext. mutica glabra rufa.

Tr. compactum muticum. *Host gr.* 4. 4. t. 7.  
*fig. alt. Schübl. Diss.* 15. *R. S.* 2. 765. *m.* 2. 415.

Tr. vulgare *S. Metzg. cer.* 11.

Hab. . . . ☉. ♂. D.

#### 49. TR. TURGIDUM.

Spiculae *dense approximatae*. Valvae *mucrone brevissimo obtuso non carinatae*. Valvula ext. aristata. Seminium ovale gibbum liberum.

A. *Albens*. Valvula ext. glabra alba.

Tr. turgidum A. B. *Metzg. cer.* 12. 113. Variat spica composita et haec aristis nigris.

B. *Albens velutinum*. Valvula ext. velutina alba.

Tr. turgidum, *Linn. sp.* 109. *R. S.* 2. 753. *m.* 2. 414. *Schübl. Diss.* 16. Tr. turgidum D. *Metzg. cer.* 13. Tr. turgidum H. *Sering. mel.* 98.

C. *Rufescens*. Valvula ext. glabra rufescens.

Tr. turgidum E. *Metzg. cer.* 14. Tr. turgidum C. *Sering. mel.* 100. Tr. Linnaeanum *Lagasc. R. S.* 2. 763.

D. *Rufescens compositum*. Valv. ext. glabra rufescens, spica composita.

Tr. turgidum M. *Metzg. cer.* 15. Tr. Linnaeanum var. ramosa *Lagasc. R. S.* 2. 763.

E. *Rufescens velutinum*. Valv. ext. velutina rufescens.

Tr. turgidum G. *Metzg. cer.* 16. Tr. turgidum B. *Sering. mel.* 98. Tr. aestivum var. o. a. *R. S.* 2. 762.

F. *Rufescens velutinum compositum*. Valv. ext. velutina, spica composita.

Tr. turgidum H. *Metzg. cer.* 16. Tr. turgidum

G. *Sering. mel.* 104. Var. *spica ramosa*. Tr. compositum *Host gr.* 3. 19. *t.* 27.

G. *Violaceum*. Valvula ext. violacea velutina.

Tr. turgidum L. *Metzg. cer.* 17.

Hab. . . . ☉. ♂. D.

## 50. TR. DURUM.

Spiculae *approximatae*. Valvae *carinatae*, *mu- crone brevi lato incurvo obtuso*. Valvula ext. aristata. Seminium ovale gibbum liberum.

A. *Albens*. Valvula ext. glabra alba.

Tr. durum A. *Metzg. cer.* 18.

B. *Albens velutinum*. Valvula ext. velutina alba.

Tr. durum. *Desfont. Lagasc. nov. gen. et sp.* 6.

*R. S.* 2. 765. *m.* 2. 414. Tr. durum B. *Metzg. cer.* 19.

Tr. durum A. *Sering. mel.* 107. Tr. villosum *Host gr.* 4. 4. *t.* 6. Tr. fastuosum *Lagasc. nov. gen. et sp.* 5. *R. S.* 2. 764. *m.* 2. 420.

C. *Rufescens*. Valvula ext. glabra rufescens.

Tr. durum C. *Metzg. cer.* 20. B. *Ser. mel.* 108.

Tr. hordeiforme *Host gr.* 4. 3. *t.* 6. *R. S.* 2. 765. *m.* 2. 415. Tr. Gaertnerianum *Lagasc. R. S.* 2. 764. *m.* 2. 420.

D. *Rufescens velutinum*. Valvula ext. velutina rufescens.

Tr. durum D. *Metzg. cer.* 20.

E. *Violaceum*. Valvula ext. glabra violacea.

Tr. durum E. *Metzg. cer.* 20. C. *Ser. mel.* 109.

F. *Album*. Spiculae dense approximatae. Valvula ext. glabra alba.

Tr. durum F. G. *Metzg. cer.* 21. 22. Tr. platy-

stachyum *Lagasc. nov. gen. et sp. 6. R. S. 2. 420. m. 2. 420.* Variat aristis nigris.

G. *Album velutinum.* Spiculae dense approximatae. Valvula ext. velutina alba.

Tr. durum H. I. *Metzg. cer. 22.* Tr. cochleare *Lagasc. gen. et sp. 6. R. S. 2. 764. m. 2. 420.* Variat aristis nigris.

H. *Rufum.* Spiculae dense approximatae. Valvula ext. glabra rufa.

Tr. durum K. *Metzg. cer. 23.*

Hab. . . . ☉. ♂. D.

### 51. TR. POLONICUM.

Spiculae remotiusculae et approximatae. Valvae *elongatae* valvulis excepta arista longiores. Valvula ext. aristata et submutica.

A. *Aristatum.* Spiculae remotiusculae. Valvula ext. aristata alba.

T. polonicum. *Linn. R. S. 2. 766. m. 2. 415. W. E. 133. E. a. 1. 96. Host gr. 3. 21. t. 31.* Tr. polonicum A. B. C. *Metzg. cer. 23—25.* Tr. polonicum B. C. *Sering. mel. 111.* Variat spica ramosa et valvula ext. villosa et glabriuscula.

B. *Submuticum.* Spiculae remotiusculae. Valvula ext. submutica glabriuscula.

Tr. polonicum D. *Metzg. cer. 25.*

C. *Compactum.* Spiculae approximatae. Valvula ext. submutica glabra.

Tr. polonicum E. *Metzg. cer. 25.* Tr. Cevallos *Lagasc. nov. gen. et sp. 6. R. S. 6. 2. 764. m. 2. 420.*

Hab. . . . ☉. ♂. D.

## 52. TR. SPELTA.

Spiculae *remotiusculae*. flosculis 2—3 fertilibus. Valvae truncatae compressae in mucronem brevem terminatae. Valvula ext. mutica et aristata. Seminium ovale subtriquetrum truncatum *glumella inclusum*.

A. *Albens*. Valvula exterior aristata glabra alba.

Tr. Spelta. *Linn. W. E.* 134. *E. a.* 1. 96. *R. S.* 2. 761. *m.* 2. 418. A. *Metzg. cer.* 26. *Sering. cer.* 118. Tr. *Zea Host gr.* 3. 20. *t.* 129.

B. *Rufescens*. Valvula ext. aristata rufescens glabra.

Tr. Spelta B. *Metzg. cer.* 27. C. *Sering. mel.* 120.

C. *Coerulescens*. Valvula exterior aristata velutina violascens.

Tr. Spelta C. D. *Metzg. cer.* 27. 28. Color interdum in nigrescentem abit.

D. *Album*. Valvula ext. mutica glabra alba.

Tr. Spelta E. *Metzg. cer.* 28. Tr. Spelta D. *Sering. mel.* 120. Tr. Spelta muticum *R. S.* 2. 767. *m.* 2. 418.

E. *Rufum*. Valvula ext. mutica glabra rufa.

Tr. Spelta F. *Metzg. cer.* 29. Tr. Spelta C. *Sering. mel. bot.* 121.

F. *Coeruleum*. Valv. ext. mutica cœrulea glabra.

Tr. Sp. G. *Metzg. cer.* 30. *Sering. mel.* 123.

Hab. . . . ☉. ♂. D.

## 53. TR. AMYLEUM.

Spiculae *dense approximatae*, flosculis 2—3 fertilibus, 1—2 sterilibus. Valvae in mucronem incurvum terminatae nervosae. Valvulae aristatae et muticae. Seminium longum gibbum subtriquetrum acutatum *glumella inclusum*.

A. *Albeus*. Valvula ext. aristata glabra alba.

Tr. amyleum A. *Ser. mel.* 125. et B. (var. magna). *Metzg. cer.* 30. Tr. dicoccum A. *Schübl. Diss.* 2. *R. S. m.* 2. 416. Tr. Cienfuegos. *Lagasc. n. gen. et sp.* 6. *R. S.* 2. 767. *m.* 2. 416. 419. Tr. Spelta *Host gr.* 3. 21. *t.* 30.

B. *Albeus velutinum*. Valvula ext. aristata velutina alba.

Tr. Amyleum C. D. *Metzg. cer.* 32. Tr. Spelta *Host gr.* 3. *t.* 30. Variat spica ramosa.

C. *Rufum*. Valvula ext. aristata glabra rufa.

Tr. amyleum E. F. *Metzg. cer.* 42. Tr. dicoccum b. *Schübl. Diss.* 29. *R. S. m.* 2. 416. Variat spica ramosa.

D. *Album*. Valvula ext. submutica glabra alba.

Tr. amyleum G. *Metzg. cer.* 33. Tr. amyleum B. *Sering. mel.* 127. Tr. tricoccum *Schübl. Diss.* 33. *R. S. m.* 2. 417.

E. *Rufum velutinum*. Valvula ext. submutica velutina rufa.

Tr. amyleum H. *Metzg. cer.* 33. Tr. Bauhini *Lagasc. n. gen. et sp.* 6. *R. S.* 2. 761. *m.* 2. 419.

F. *Rufum*. Val. ext. submutica glabra rufa.

Tr. amyleum I. *Metzg. cer.* 34.

G. *Atratum*. Valvula ext. aristata atrata velutina.

Tr. amyleum K. L. *Metzg. cer.* 34. Tr. atratum *Host gr.* 4. 5. *t.* 8. Variat spica ramosa.

Hab. . . . ☉: ♂. D.

#### 54. TR. MONOCOCCON.

Spiculae dense approximatae, *flosculo uno fertili*, duobus sterilibus muticis. Valvae subtridentatae

glabrae. Valvula ext. glabra. Seminium triquetrum arstissime *glumella conclusum*.

Tr. monococcon. *W. E.* 133. *E. a.* 1. *t.* 96. *R. S.* 2. 766. *m.* 2. 415. *Host gr.* 3. 22. *t.* 32. Hab. . . . ☉. D.

## 15. AGROPYRUM.

*Inflorescentia spicata et subracemosa* rachi excisa. *Spiculae multiflorae* rachi adversae, flosculi omnes fertiles sensim superne decrescentes. *Gluma* bivalvis, valvae flosculis inferioribus breviores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior saepe aristata. *Parapetala* 2 acuta rarius subbifida superne pilosiuscula. *Styli* plumosi. *Germen* apice pilosiusculum.

### 55. A. VILLOSUM. ✓

Spica disticha, spiculae *triflorae*. Valvae aristatae nervo submarginali in altero latere *fasciculate piloso*, medio basi piloso. Valvula exterior nervosa aristata.

Tr. villosum. *Beauv. R. S.* 2. 768. *m.* 2. 421. *E. a.* 1. 96. *Secale villosum*. *Linn. W. E.* 132. *Host gr.* 2. 35. *t.* 47. Hab. in Europa australi. ☉. D.

### 56. A. ORIENTALE.

Folia pubescentia. Spica disticha, spiculae *tri-quadriflorae*. Valvae aristatae *pilosae* flosculos aequantes. Valvulae aristatae *pilosae*.

A. orientale *R. S.* 2. 757. *m.* 2. *t.* 411. *Triticum orientale* *Marsch. t. c.* 1. 86. 3. 95. *Secale orientale* *W. sp.* 1. 472. Hab. in Europa australi orientali et Oriente. ☉. D.

## 57. A. PROSTRATUM.

Caulis *prostratus*. Spica brevis disticha, spiculae compressae 3—4 florum dense approximatae patentes. Valvae eminenter carinatae *acutato-aristatae* flosculis paullo breviores. Valvula exterior laevis *glabra* acutato-aristata.

A. prostratum. *R. S.* 757. *m.* 2. 411. Triticum prostratum *Linn. suppl. W. E. S.* 6. *E. a.* 1. 96. Secale prostratum *Linn. Jacq. hort.* 3. 23. *t.* 44. Secale pumilum *Linn. suppl. Pers. syn.* 1. 109. Hab. in Europa australi orientali et Oriente. ☉. D.

## 58. A. SQUARROSUM.

Caulis *basi prostratus*. Spica brevis disticha, spiculae compressae 3—4 florum subremotiusculae patentes. Valvae eminenter carinatae longe acutatae flosculis parum breviores. Valvula exterior longe aristata laevis *glabra*.

Triticum squarrosum *Roth. R. S.* 2. 768. *m.* 2. 421. *W. E. S.* 6. Tr. patulom *W. E.* 134. Tr. planum *Desfont. Poir. enc. meth. suppl.* 2. 676. Hab. in Aegypto, ☉. D. Spiculae 7 lin. longae, quae in praecedente 4 lin.

## 59. A. CRINITUM.

Caulis *basi prostratus*. Spica brevis disticha, spiculae dense approximatae 3—4 florum patentes. Valvae eminenter carinatae *ex obtuso aristatae*. Valvula exterior carinata aristata laevis *glabra*.

Hab. . . . ☉. D.

Caulis geniculato-decumbens. Folia vagina laevi glabra, ligula brevi truncata, lamina demum convoluta sulcata. Spica vix poll. longa, spiculae ob approximationem

mationem patentes cum aristis 4 lin. longa. Callus magnus sub spicula. Valvae flosculo inferiore duplo breviores laeves glabrae obtusatae, arista valva fere longior. Valvula carinata laevis glabra acutata, arista valvula parum brevior; interior acuta. Affine prostrato, sed aristis diversum.

60. *A. SIBIRICUM*.

Caulis non stoloniferus. Folia pilosa. Spica longiuscula, spiculae *dense approximatae* 4—6 *florae*. Valvae flosculis breviores *longe acutatae*. Valvula exterior superne subtrinervia *acutata obtusiuscula*, interior nervo submarginali ciliato.

*A. sibiricum* *R. S.* 2. 756. *m.* 2. 410. *Triticum sibiricum* *W. E.* 1. 135. *E. a.* 1. 97. Hab. in Sibiria. 2. D.

61. *A. VARIEGATUM*.

Caulis stoloniferus. Folia pilosa. Spica longiuscula, spiculae *dense approximatae* 6—8 *florae*. Valvae *breviter acutae*. Valvula exterior superne multinervosa *acutata obtusiuscula*, interior nervo submarginali ciliato.

*A. variegatum* *R. S.* 2. 759. *m.* 2. 412. *Triticum variegatum* *Fischer Spreng. pugill.* 2. 24. *W. E.* 96. Hab. . . . 2. D. Affine praecedenti.

62. *A. DASYANTHUM*.

Caulis stolonifer. Folia sulcata scabra. Spica longa, spiculae *superne approximatae* 6—8 *florae*. Valvae carinatae acutiusculae laeves glabrae. Valvula ext. laevis *pilis densis tecta* obtusa.

*A. dasyanthum*. *Ledeb. R. S. m.* 2. 410. Hab. in arena mobili ad Borysthenem prope Oleschky. 2. D.

## 63. A. DENSIFLORUM.

Spica longiuscula, spiculae *dense approximatae* 6—8—12 *florae*. Valvae flosculis *longius aristatae*. Valvula exterior superne nervosa *brevius aristata*, interior nervo submarginali scabro-ciliato.

A. densiflorum. *R. S.* 2. 733. *m.* 2. 410. Triticum densiflorum. *W. E.* 135. *E. a.* 1. 97. Hab. in Sibiria. 4. D.

## 64. A. CRISTATUM.

Caulis *superne pubescens*. Spica longiuscula disticha, spiculae *approximatae quadriflorae*. Valvae carinatae *aristatae*, interior subtrinervia. Valvula exterior carinata subtrinervia *aristata*.

A. cristatum. *R. S.* 2. 758. *m.* 2. 411. Triticum cristatum. *Linn. Schreb. gr.* 1. 12. *t.* 23. *f.* 2. *Host gr.* 2. 19. *t.* 24. *E. a.* 1. 97. Hab. in Europa australi praesertim orientali et Caucaso. 4. D.

## 65. A. PECTINIFORME.

Caulis *glaber*. Spica longiuscula subdisticha, spiculae *approximatae* 6—8 *florae*. Valvae *aristatae*, exterior subseptemnervia *aristata*.

A. pectiniforme *R. S.* 2. 758. *m.* 2. 411. Triticum pectinatum. *Marsch. W. E.* 135. *E. a.* 1. 97. Hab. in Tauriae rupibus. 4. D. Affine praecedenti, differt glabritie caulis, spiculis valvis plurinerviis. Habemus formam intermediam, caule pubescente, spiculis plurifloris, valva exteriori expresse trinervia.

## 66. A. DESERTORUM.

Caulis *glaber*. Spica longiuscula disticha rachi *glabra*, spiculae *approximatae quadriflorae*. Val-

vae carinatae *aristatae*. Valvula exterior carinata trinervia subquinenervia *aristata*.

A. desertorum *R. S. m. 2. 412*. Triticum desertorum *E. a. 1. 97*. Hab. in deserto Cumano. 24. D. Fischer. Cilia in valvis valvulisque saepe deficiunt. Valde affine *Tr. cristato* et fortassis varietas, differt glabritie et foliis angustioribus; *caulina* enim in *Tr. cristato* 3 *lin. lata*, in hocce *vix 2 lin.*

### 67. A. ANGUSTIFOLIUM.

Caulis *glaber*. Spica longiuscula disticha, rachis *pubescens*, spiculae *approximatae 6—8 florum*. Valvae carinatae *aristatae*. Valvula exterior trinervia subquinenervia *aristata*.

A. angustifolium *R. S. m. 2. 412*. Triticum angustifolium *E. a. 1. 97*. Hab. in Sibiria. 24. D. Cilia valvarum et valvularum saepe deficiunt. Folia non angustiora ac in praecedente nunc invenio; in illo quoque demum convoluta. Differt hirsutiae racheos et spiculis multifloris a praecedente, an eadem species?

### 68. A. IMBRICATUM.

Caulis *superne pubescens*. Spica breviuscula, subdisticha, spiculae *approximatae 4 florum*. Valvae carinatae *aristatae* glabrae aut carina ciliatae. Valvula exterior trinervia *pilis densis tecta aristata*.

A. imbricatum *R. S. 2. 757. m. 2. 411*. Triticum imbricatum *Steven Marsch. t. c. 1. 83. 3. 96*. Hab. in Iberia. 24. D.

### 69. A. MURICATUM.

Caulis *superne pubescens*. Spica longiuscula disticha, spiculae *approximatae 6—8 florum*. Valvae

carinatae *aristatae* ciliatae. Valvula exterior triner-  
via *pilis densis tecta aristata*.

A. muricatum *R. S. m. 2. 414.* Triticum im-  
bricatum *E. a. 1. 97.* Hab. in Sibiria. 2. D.

Non repugno, qui sex species: cristatum, pecti-  
niforme, desertorum, angustifolium, imbricatum, mu-  
ricatum in unam combinare velit.

#### 70. A. JUNCUM.

Folia *convoluta sulcata inter sulcos pilorum*  
*oppositorum seriebus duabus.* Spica elongata, spi-  
culae *remotiusculae* 6—8 florum. Valvae subner-  
vosae *obtusae truncatae.* Valvula exterior laevis  
obtusa aut obtuse mucronata.

Agr. junceum *Beauv. R. S. 2. 750. m. 2. 409.*  
Triticum junceum *Linn. Sibth. gr. t. 99. Host gr. 3.*  
*23. t. 33.* Hab. ad littora maris in Europa. 2. D.  
Spica fragilis. Pileorum distributio in foliis character  
essentialis est. Valvula interior margine ciliata.

#### 71. A. GIGANTEUM.

Caulis *non stoloniferus.* Folia *sulcata scabra.*  
Spica *longissima rigida,* spiculae *remotiusculae*  
6—8 florum, *rachis angulis laevibus.* Valvae multi-  
nervosae *obtusae.*

Agr. giganteum *R. S. 2. 753.* Triticum gigan-  
teum *Retz. obs. 1. 7. Roth catal. 1. 17.* Tr. elon-  
gatum *Host gr. 2. 18. t. 23.* Tr. rigidum *Schrad.*  
*germ. 1. 392. W. E. 135. E. a. 1. 98.* Agr. rigi-  
dum *R. S. 2. 753.* Hab. in maritimis Europae au-  
stralis. 2. D.

## 14. Agropyrum.

37

### 72. A. GLAUCUM.

Caulis *stolonifer*. Folia *sulcata scabra glauca*. Spica *longa*, spiculae *remotiusculae*, rachis *angulis scabris*. Valvae *multinervosae obtusae*. Valvula ext. *superne multinervosa obtusa*.

A. glaucum *Mert. et Koch germ. 1. 705*. Triticum junceum *Host gr. 2. 18. t. 22. cfr. 3. 23.* ubi Tr. intermedium vocat. Hab. in Europa media. 24. Parapetala subbifida.

### 73. A. PUNGENS.

Caulis *stolonifer*. Folia *mox convoluta sulcata* scabra margine hispida. Spica *longa*, spiculae *remotiusculae* 6—8 florum, rachis *angulis scaberrimis*. Valvae *multinerviae obtusiusculae*. Valvula ext. *laevis obtusa aut obtusiuscula*.

A. pungens *Pers, Mert. et Koch germ. 1. 704*. Tr. junceum *W. E. S. 6*. Hab. ad littora Europae media. 24. D. Folia et in superficie pilis rigidis saepe adspersa.

### 74. A. REPENS.

Caulis *stolonifer*. Folia *sulcata scabra*. Spica *longa*, spiculae *remotiusculae* 6—8 florum, rachis *angulis scabris saepe pubescentibus*. Valvae *nervosae acutae mucronatae et aristatae*. Valvula ext. *superne nervosa mucronata aut aristata*.

A. repens *Beauv. R. S. 2. 754. m. 2. 440*. Triticum repens *Linn. W. E. 134. E. a. 1. 98. Schreb. gr. 1. 26. t. 3. Host gr. 2. 17. t. 21*. Hab. per totam Europam ad sepes, agrorum margines. 24. D. Parapetala lanceolata superne ciliata. Tr. littorale *E. a. 1. 98.* est varietas Tr. repentis. Hostii plantam non vidi.

## 75. A. RUPESTRE.

*Caulis non stolonifer.* Folia sulcata scabra demum convoluta. Spica longiuscula, spiculae *remotiusculae triflorae*. Valvae nervosae submucronatae. Valvula ext. superne nervosa, arista valvulae aequali.

Agr. rupestre *R. S. m.* 2. 409. Triticum rupestre *E. a.* 1. 98. Hab. in Sibiria. Fischer. 4. D. Minus Tr. repente. *Spiculae tenues 5—6 lin. longae.*

## 76. A. CANINUM.

*Caulis non stolonifer.* Folia striata scaberrima. Spicae longae, spiculae *remotiusculae 4—6 florum*. Valvae nervosae *aristatae*. Valvula ext. superne nervosa, aristata.

Agr. caninum. *R. S.* 1. 156. *m.* 2. 411. Triticum caninum *Linn. sp. ed.* 1. 86. *E. a.* 1. 98. *Host gr.* 2. 20. *t.* 25. Elymus caninus *Linn. suec.* 2. 112. *W. sp.* 1. 469. Hab. in Europa media. 4. D. Spicula *pedicello brevi crasso pilosiusculo* insistit, hinc transit ad Brachypodium.

## 16. BRACHYPODIUM.

*Inflorescentia subracemosa, rachi excisa articulata. Spiculae multiflorae, pedicello brevi. Gluma bivalvis, valvae inaequales flosculis inferioribus breviores. Glumella bivalvis, valvula exterior sub apice aristata aut mutica. Parapetala lanceolata superne hirta in altera sectione bifida. Styli plumosi. Germen superne villosum.*

## 16. Brachypodium.

*Agropyro* proximum genus parum distinctum, eodem modo aristatas et muticas continens species, parapetalis integris et bifidis.

### Subgen. 1. *ARISTATA*.

#### 77. BR. PINNATUM.

Caulis stoloniferus. Folia scaberrima saepe pilosa. Spica erecta. Spiculae teretes 16—18 florum saepe hirsutae. Valva ext. trinervia, interior multinervia utraque acuta. Valvula exterior nervosa, arista valvula brevior.

*A. Hirsutum.* Folia spiculaeque hirsutae.

*Brachypodium pinnatum Beauv. R. S. 2. 736. m. 2. 403. E. a. 1. 94. Bromus pinnatus Linn. W. sp. 1. 438. Leers herb. t. 10. f. 3. Host gr. 1. 18. t. 22. Festuca pinnata Schrad. germ. 1. 342. W. E. 1. 117. Triticum pinnatum De Cand. fr. 3. 84. n. 1663. suppl. p. 283. Hab. in Europa media. 4. D.*

*B. Glabrum.* Folia, spiculaeque glabrae.

*Br. rupestre R. S. 2. 736. m. 2. p. 404. E. a. 1. 24. Bromus rupestris Host gr. 4. 14. t. 17. Triticum pinnatum De Cand. fr. suppl. 283. Bromus pinnatus B. Sebast. et Mauri rom. 39. Hab. in Europa australi. 4. D.*

#### 78. BR. PHOENICOIDES.

Folia lamina convoluta scaberrima. Spiculae teretes 16—18 florum interdum pubescentes. Valva exterior quinquenervia, interior multinervia, utraque acuta. Valvula exterior multinervia, arista brevissima.

*Br. phoenicoides R. S. 270. m. 2. 405. Festuca phoenicoides Linn. mant. n. 33. Gouan ill. 4. Fe-*

stuca nr. 5. *Gerard galloprov.* 95. t. 2. f. 2. Hab. in Europa australiori. 24. T. Variat uti praecedens spiculis glabris et hirtis. Spiculae ad 4 et 6. lin. ultra poll. longae.

## 79. BR. HOSTI.

Caulis basi flexuosus *ramosus*. Folia lamina *angusta* scaberrima demum convoluta. Spiculae remotiusculae 6—8 *florae*. Valva ext. multo minor trinervia, interior multinervia. Valvula exterior multinervia breviaristata.

*Bromus Plukeneti*. *Host gr.* 47. t. 19. Hab. in Europa australi orientali. 24. T. Spiculae vix poll. longae.

## 80. BR. PLUKENETI.

Caulis basi *ramosissimus*. Folia lamina tenui *convoluta acutata* scabra. Spica *depauperata*, spicula una alterave. Valvae trinerviae exterior, nervis laevigatis, interior expressis. Valvula exterior trinervia breviaristata.

Br. ramosum *R. S.* 2. 737. *m.* 2. 405. *E. a.* 1. 94. Festuca caespitosa *Desfont. atl.* 1. p. 91. *Bromus Plukeneti* *Allion ped. n.* 22. 33. Hab. in Europa australi. 24. T. Valde affine praecedenti et sequenti. *Bromus caespitosus* Host. valde differt.

## 81. BR. OBTUSIFOLIUM.

Caulis basi *ramosissimus*. Folia lamina tenui *convoluta apice obtuso calloso* scabra. Spica *depauperata*, spicula una alterave. Valvae trinerviae, exterior nervis expressis, interior laevigatis.

Br. obtusifolium. *E. a.* 1. 95. Festuca obtusifolia *Lagasc. ined.* Hab. in Hispania. 24. T. Scabri-

ties caulis variat. Differt a praecedente vix, nisi callo in apice foliorum.

## 82. BR. SYLVATICUM.

Caulis non stoloniferus ad genicula pubescens. Folia scabra saepe pilosa. Spica *nutans*, spiculae teretes 6 *florae* saepe pilosae. Valvae multinerviae. Valvula ext. multinervia superne nervis expressis acutata, arista valvae aequali.

Br. sylvaticum *R. S.* 2. 741. *m.* 2. 405. *E. a.* 1. 95. Bromus sylvaticus *Pollich Host gr.* 1. 16. *t.* 21. Triticum sylvaticum *Moench meth. n.* 103. *De Cand. fr. n.* 1665. *suppl. p.* 283. Bromus gracilis *W. sp.* 1. 438. Festuca gracilis *Schrad. germ.* 1. 343. Hab. in Europae borealis et mediae sylvaticis. 2. Variat spiculis glabris et pilosis. Folia 3 lin. lata.

## 83. BR. MEXICANUM.

Caulis *retrorsum scaberrimus*. Folia scabra *erecta*; spiculae teretes 6 *florae*. Valvae trinerviae. Valvula ext. superne nervosa scabra acutata, arista valva parum brevior.

Festuca mexicana *Lagasc. n. gen.* 4. *R. S.* 2. 732. Hab. in Mexico. ☉. T. Valva interior nervo marginali superne longe ciliato.

*Subgen. 2. MUTICAE.*

## 84. BR. HALLERI.

Folia *brevia subfiliformia*. Spiculae remotiusculae 6—8 *florae*, flosculis distichis. Valvae subtrinerviae obtusae. Valvula exterior laevissima obtusa.

Br. Halleri *R. S.* 2. 744. *m.* 2. 406. *E. a.* 1. 95. Triticum Halleri *Gaudin. agr.* 1. 349. Triticum te-

nellum *W. sp.* 1. 482. Hab. in Europa australi; in Lusitania quoque invenimus. ☉. D. Caulis vix spithamam longus. Callus magnus sub flosculis. Spiculae demum expansae distichae. Valvula interior obtusa glabra. Parapetala 2 lanceolata acuta bifida.

### 85. BR. LOLIACEUM.

Folia *longiuscula*. Spiculae remotiusculae teretes 10—12 *florae*. Valva ext. uninervia, interior trinervia, utraque obtusa. Valvula ext. subinquenervia laevis obtusa.

*Festuca loliacea* *Huds. Schrad. germ.* 1. 341. *Smith engl.* 1. *Festuca elongata* *Ehrh. Beitr.* 6. 133. *Festuca Phenix* *Thuill. par.* 4. 1. 52. *Schedonorus loliaceus* *R. S.* 2. 763. *m.* 2. 390. *Triticum patens* *Broter. lusit.* 1. 120. Hab. in Europa media et australi. 4. D. Caulis 2 ped. altus, cingulis ad nodis fuscis. Spica longa saepe ramosa. Valvula interior obtusa glabra. Parapetala 2 bipartita acuta.

---

## FESTUCA.

### v. i. Festucae racemosae.

---

### 17. TRACHYNIA.

Inflorescentia *subracemosa*, *rachi excisa* articulata. Spiculae ultra decemflorae, *pedicello brevissimo*. Gluma bivalvis, valvae inaequales *flosculis inferioribus longiores*. Glumella bivalvis, valvula exterior ex apice aristata. Parapetala 2 magna lanceolata glabra. Styli penicillares. *Germen* superne villosum.

## 86. TR. DISTACHYA.

Caulis *laevis*. Folia breviter scabriuscula. Spica depauperata, spicula una alterave ad 30 flora disticha. Valvae multinerviae acutae. Valvula exterior multinervia pilis sparsis acuta, arista valvula fere longior.

Bromus distachyos *Linn. sp. 1. 115. W. sp. 1. 439. Host gr. 1. 16. t. 20. Festuca distachyos Schrad. germ. 1. 346. W. E. 118. Brachypodium distachyon R. S. 2. 741. m. 2. 406. E. a. 1. 95. Hab. in Europa australi. ☉. D.*

## 87. TR. RIGIDA.

Caulis *scaberrimus*. Folia breviter scabra. Spica depauperata, spiculae tres distichae ultra 12—16 florum. Valvae multinerviae acutae. Valvula ext. multinervia pilis sparsis acuta, arista valvula fere longior.

Festuca rigida *Roth Cat. 1. 12. W. E. 1. 119. Triticum asperum De Candolle monsp. 153. Brachypodium rigidum E. a. 1. 96. Hab. in Europa australi. ☉. D. In hoc et praecedente valvula interior obtusissima nervo submarginali rigide ciliato.*

## 18. GAUDINIA.

*Spicae* rachis *excisa dentibus nullis*, spiculis adversis multifloris. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales flosculis breviores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior *arista dorsali articulata deflexa*. *Parapetala* ovalia acuta breviter. *Styli* plumosi. *Germen* superne hirsutum.

## 88. G. FRAGILIS.

Folia pilosa. Rachis articulata.

G. fragilis. *Beauv. R. S. 2. 694. m. 2. 337. E.*

*a.* 1. 96. *Avena fragilis* Linn. Schreb. gr. 2. 19. t. 24. f. 3. Host gr. 2. 40. t. 54. Hab. in Europae australis graminosis. ☉. T. Variat spiculis glabris et hirsutis. Rachis fragilis. Valva ext. 2—3 nervia, interior multinervia. Valvula ext. flosculorum inferiorum bifida superiorum integra margine et dorso subciliata bifida, arista supra medium basi torta; interior apice producta bifida denticulata; pedicelli glaberrimi.

---

### 19. OREOCHLOA.

*Inflorescentia racemosa, rachi non excisa.* Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis, valvae subaequales *muticae* flosculis inferioribus paullo breviores dilatatae. Glumella bivalvis, valvulae subaequales *muticae* basi margine non involutae.

#### 89. O. DISTICHA.

Folia radicalia filiformia, caulina lamina convoluta. Spica ovalis. Valvae et valvulae latae acutiusculae.

Sesleria disticha Pers. R. S. 2. 605. m. 2. 337. *E. a.* 1. 84. Poa disticha Wulfen Jacq. misc. 2. 74. ic. t. 19. Host gr. 2. 55. f. 76. Sturm germ. f. 6. Poa seslerioides Allion ped. n. 2208. t. 91. f. 1. Hab. in Alpibus Helvetiae et adjacentibus. 4. F. Racemus brevis 8—10 lin. longus, spiculis dense positus.

---

### 20. CATOPODIUM.

*Spicae rachis plana horsum vorsum flexa excisa.* Spiculae alternae secundae multiflorae. Gluma bivalvis, valvae inaequales, flosculis inferioribus

breviores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior mutica. *Parapetala* 2 lanceolata. *Styli* subpenicillares.

## 90. C. LOLIACEUM.

Folia sulcata scabriuscula. Spica inferne subinde ramosa, spiculae 8florae et ultra. Valvae trinerviae, nervis in medio, acutiusculae. Valvulae subtrinerviae, nervis lateralibus prope marginem.

Brachypodium loliaceum *R. S.* 2. 746. *m.* 2. 407. *E. a.* 1. 95. Triticum loliaceum *Smith br.* 1. 139. *Engl. Bot. t.* 211. *Schräd. germ.* 1. 395. Triticum unilaterale *Vill. delph.* 2. 165. *Host gr.* 2. 21. *t.* 27. Triticum Rottboella *De Cand. fr.* 1. 86. *n.* 1669. Poa loliacea *Hudson Pers. syn.* 1. 62. Hab. in Europa australi et media. ☉. D.

## 21. WANGENHEIMIA.

*Inflorescentia racemosa, rachi planiuscula flexuose lineata lineis excavatis. Spiculae secundae multiflorae. Gluma* bivalvis flosculos superans, valvae basi connexae sese non amplexantes. *Glumella* bivalvis, valvulae muticae. *Parapetala* lanceolata bifida. *Styli* semipenicillares.

## 91. W. LIMA.

Folia convoluta. Spiculae 4 florae. Valva exterior angustior, interior lata, utraque carinata acuta. Valvula exterior carinata acuta basi pilis brevissimis tecta, interior subbifida.

W. Lima *Trin. agrost.* 132. W. disticha *Moench. meth.* 200. *Cynosurus* Lima *Linn. Loefl. it.* 41. *Cavan. ic.* 1. 62. *t.* 9. *Desfont. atl.* 1. 83. *t.* 19. *Dineba* Lima *Beauv. R. S.* 2. 712. *m.* 2. 391. Hab. in Hispania. ☉. T.

---

## BRIZOPYRUM.

v. i.

---

## Sectio II.

### SPICATAE SUBTERMINALES.

*Inflorescentia* spicata aut racemosa terminalis (caulis et ramorum) monoclina. *Spiculae* uni-multiflorae villis non cinctae. *Flosculi* structura similes.

---

### Fam. I. SPARTINACEAE.

*Spicae* alternae. *Spiculae* uniflorae. *Valvae* carinatae. *Stylus* 1 bipartitus.

---

### 22. SPARTINA.

*Spiculae* uniflorae unilaterales solitariae biseriatae rachis appressae. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales saepe aristatae, exterior minor angustior, interior glumellae aequalis. *Glumella* bivalvis, valvulae subaequales, utraque carinata. *Parapetala* nulla. *Stylus* 1 compressus bipartitus basi pilosus superne plumosus.

## 92. SP. CYNOSUROIDES.

Folia demum convoluta scabra. Rachis aciebus hispidio - scabris. Valvae carina aculeato - scabrae, aristae valva minores. Valvula exterior carina hispida scabra, interior membranacea.

Sp. cynosuroides *W. E.* 81. *E. a.* 1. 40. *R. S.* 2. 261. *m.* 2. 249. *Trachynotis cynosuroides Michaux amer.* 1. 64. *Limnetis cynosuroides Pers. syn.* 1. 79. *Dactylis cynosuroides Linn. fil. fasc.* 1. t. 9. Hab. in rupibus supra sinum Hudsonis. 4. D.

## Fam. II. PASPALINAE.

*Spicae* alternae et subalternae. *Spiculae* uniflorae. *Valvae* planae. *Styli* 2.

## 23. PASPALUS.

*Spiculae* unilaterales uniflorae adversae. *Gluma* bivalvis, valvae aequales muticae. *Glumella* bivalvis, valvulae aequales cortilagineae muticae hinc planae illinc convexae. *Parapetala* truncata basi attenuata. *Styli* 2 penicillares.

*Subgen.* 1. *RACHIS FOLIACEA. CERESIA.*

## 93. P. MEMBRANACEUS.

Folia laevia basi pilis paucis, ligula truncata. Panícula ramis lateralibus 1—3, rachi viridi lateribus fuscis dense ciliata. Valvae dense pilosae. Valvulae glabrae.

*P. membranaceus R. S.* 2. 290. *m.* 2. 166. *E. a.* 1. 102. *Ceresia elegans Pers. syn.* 1. 85. *W. E.* 83. Hab. in Peruvia? 4. C.

Subgen. 2. *RACHIS ANGUSTA.*Div. 1. *Spicae conjugatae aut solitariae.*

## 94. P. SINGULARIS.

Caulis decumbens *nodis lanatis*. Folia pilosa. Spica *solitaria*. Spiculae *biseriatae*. Valvae *rotundatae trinerviae glabrae*.

Hab. in Brasilia. ☉. T.

Caulis pedalis decumbens pilis ad nodos longis. Vaginae striatae margine dense pilosae caeterum pilis sparsis. Spica poll. et ultra longa. Spiculae parvae lin. longae. Valvae acumine nullo. Valvulae laevissimae.

## 95. P. SETACEUS.

Folia *hirta*. Spicae duae, tresve incurvae. Spiculae *quadriseriatae*. Valvae *rotundatae laevissimae enerviae glabrae*.

P. setaceus *Michaux Flügge R. S. 2. 306. m. 2. 171. E. a. 1. 103.* P. pubescens *Muehlenb. W. E. 89. Hornen. hafn. 1. 77.* Hab. in America septentrionali. ☉. D.

## 96. P. LASIOGONUS.

Caulis *ad nodos hirtus*. Folia vagina superne margine *hirta*, lamina *pubescens*. Spicae tres patentes flexae. Spiculae *biseriatae*. Valvae *rotundatae trinerviae glabrae*.

Hab. . . . ☉. T.

Caulis basi decumbens debilis subpedalis, nodis valde pilosis. Folia vagina glabra margine dense pilosa, lamina 4 lin. longa pilis longis sparsis in inferioribus confertis. Spicae poll. circiter longae, pedicelli parvi, flores multi non evoluti unde laxi. Valva altera

altera convexa altera plana, utraque acumine vix ullo trinervia glabra viridis, convexa brevior. Valvulae striis subtilissimis longitudinalibus.

## 97. P. KORA.

Folia *glabra*. Spicae patentiusculae elongatae; spiculae solitariae *biseriatae*. Valvae *rotundatae triquinenerviae*, valvulae demum aureae.

P. Kora *W. E.* 89. *Roxb. ind.* 1. 282. *R. S. m.* 2. 168. P. scrobiculatus *E. a.* 1. 102. Hab. in India orientali. 24. C.

## 98. P. ELEGANS.

Caulis *nodis barbatis*. Folia *pilosa*. Spicae pedicellatae patentissimae. Spiculae *geminae 2—4 seriatae*. Valvae *rotundatae pubescentes ciliatae*.

P. elegans *Flügge pasp.* 184. P. tenellus *W. E.* 1. 89. *R. S.* 2. 313. Hab. . . . 24 C. Minime tenella planta.

## 99. P. VIRGATUS.

Folia infima vagina pilosa, superiora glabra scabriuscula. Spiculae *geminae subquadriseriatae*. Valvae *trinerviae breviter acutae* margine hirsutae.

P. virgatus *Linn. Jacq. coll.* 1. 112. *ic. rar.* 1. t. 11. *R. S.* 2. 314. *m.* 2. 175. Hab. in America meridionali, Monte Video. Sellow. 24. C. Nostra habet spicas 4—6 brevipedunculatas, valvas trinervias virentes margine undique pilis longis, rachin laevem vix pilosam et ciliatam, pilis longis *ad basin spicae*, attamen habitu omnino refert P. virgatum Jacq.

## 100. P. PLATENSIS.

Folia laeviuscula *glabra*. Spicae *sessiles longissimae* inde nutantes. Spiculae *geminae quadrise-*

*riatae*. Valvae 3—5 *nerviae breviter acuminatae margine lanato*.

*P. platensis Sprengel syst. 1. 240.* Hab. in Montevideo. Sellow. 4. D. Caulis 3—4 ped. altus. Fol. —5 lin. lata non tam lata quam in *P. virgato*, lamina retrorsum paullulum scabra. Spicae ad poll. longae. Valvae 2 lin. longae lin. et dim. latae flaventes margine fuscescente.

*Div. 3. Spicae numerosae superne aggregatae.*

#### 101. *P. VARIEGATUS.*

Folia laminae basi pilosa. Spicae subsessiles arrectae basi pilosae. Spiculae geminae quadriseriatae pilis stipatae. Valvae *ovales acutiusculae pubescentes*.

Hab. . . . 4. C. Gramen elegans. Caulis strictus 3—4 ped. altus. Folia vagina longissima. Spicae *inferiores ad 2 poll. longae*, superiores minores, illae subpedicellatae, hae sessiles. Valva *plana flavescens basi rubra convexa fusco irrorata*.

#### 102. *P. PANICULATUS.*

Caulis *nodis barbatis*. Folia vagina pilosa, lamina ciliata, ligula pilosissima. Spicae subsessiles tenues, ad basin pilis longis. Spiculae solitariae et geminae subquadriseriatae. Valvae *subrotundae pubescentes subtrinerviae*.

*P. paniculatus Linn. R. S. 2. 312.* Hab. in India occidentali. 4. C. Folia lata ad 8 lin. et ultra lata.

#### 103. *P. STOLONIFERUS.*

Folia glabra. Spicae numerosissimae *aggregatae breviusculae*, rachi plana. Spiculae solitariae

biseriatae. Valvae *oblongae apiculatae undatae subtrinerviae*.

P. stoloniferus *Bosc. W. E.* 90. *E. a.* 1. 103. *R. S.* 2. 295. Hab. in America boreali, locis planis borealibus, in montosis australibus. 2. D

## DIGITARIA.

v. i.

Species valva extima carentes.

## 24. OEDIPACHNE.

*Spicae* alternae, flosculi solitarii biseriati, *pedicello superne globoso* sub flore articulado; *spiculae* uniflorae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales *glumella* longiores. *Glumella* bivalvis, valvulae subaequales cartilagineae. *Styli* penicillares.

### 104. O. PUNCTATA.

Folia scabra, vaginae ora pubescens. *Spicae* arrectae, *pedicello* brevissimo. Valvae lanceolatae acutae pilis adpressis *glumella* sublongiores. Valvula ext. acutiuscula, interior obtusa.

*Milium punctatum* *Linn. Sp.* 91. *W. sp.* 1. 389. *Paspalus punctatus* *Flügge Pasp.* 127. *Piptatherum punctatum* *Beauv. R. S.* 2. 329. *m.* 2. 184. Hab. in graminosis udis Antillarum. 2. D.

## Fam. III. CYNODONTEAE.

*Spicae* fasciculatae. *Spiculae* uniflorae, cum *pedicello* alterius floris.

## 25. CYNODON.

*Spiculae* unilaterales bi-pluriseriatae uniflorae, plano rachi adversae. *Gluma* bivalvis, valvae carinatae subaequales glumella breviores. *Glumella* bivalvis, valvulae carinatae, interior inclusa. *Pedicellus* alterius floris abortivus. *Styli* penicillares.

## 105. C. DACTYLON.

Caulis ramosus repens stolonifer. Folia saepe ciliata, ligulae loco pili. Spicae patentiusculae, spiculae biseriatae. Valvae ex nervo mucronatae. Valvula exterior carina pilosa mutica.

C. Dactylon *Pers. W. E.* 90. *E. a.* 1. 103. *R. S.* 2. 410. *m.* 2. 218. *Panicum Dactylon Linn. W. sp.* 1. 342. *Digitaria stolonifera Schrad. germ.* 1. 165. *t.* 3. *f.* 9. Hab. in Europa australi.

*Cynodon linearis E. a.* 1. 103. *W. E.* 90. *R. S.* 2. 412. *m.* 2. 413. a. C. Dactylo non differt.

## Fam. IV. CHLORIDEAE.

Spicae alternae aut fasciculatae. Spiculae bi-multiflorae.

## 26. LEPTOCHLOA.

*Spicae* alternae saepe ramosae, spiculae *monostichae* bi-multiflorae rachi adpressae. *Gluma* bivalvis, *valvae muticae, exterior minor introrsum versa. Glumella* bivalvis, valvula exterior saepe sub apice aristata. *Styli* 2 penicillares.

## 106. L. DOMINGENSIS.

Folia pilis longis sparsis. Spicae elongatae; spi-

culae 5—6 *florae*. Valvula exterior laevis et *glabra* sub apice saepe arista tenui.

L. domingensis *E. a.* 1. 103. Cynosurus domingensis *Jacq. misc.* 2. 363. *ic.* 22. Cynosurus virgatus *B. W. sp.* 1. 41. 7. Eleusine domingensis *Pers. syn.* 1. 87. *W. E.* 113. Rhabdochloa domingensis *R. S.* 2. 619. *m.* 2. 343. Hab. in Antillis. 4. C.

## 107. L. VIRGATA.

Folia piligera. Spicae elongatae, spiculae 5—6 *florae*. Valvula exterior *superne ciliata* nec non *pilis sparsis* incumbenibus, arista sub apice tenui.

L. virgata *R. S.* 2. 580. *m.* 2. 322. Cynosurus virgatus *Linn. W. sp.* 1. 417. Eleusine virgata *Pers. syn.* 1. 87. *W. E.* 1. 113. Hab. in Jamaica. 4. C.

## 108. L. FILIFORMIS.

Folia scabra. Spicae mediocres, spiculae remotiusculae *triflorae*. Valvae lanceolatae *flosculis inferioribus breviores aut aequales*. Valvula exterior lanceolata obtusa.

L. filiformis *R. S.* 2. 580. *m.* 2. 322. *E. a.* 1. 103. Eleusine filiformis *Pers. syn.* 1. 87. *W. E. S.* 6. Hab. in America meridionali. ☉. C.

## 109. L. TENERRIMA.

Folia vagina pilis sparsis, lamina glabra. Spicae mediocres, spiculae remotiusculae *biflorae*. Valvae lanceolatae *flosculo inferiore longiores*. Valvula exterior ovalis obtusiuscula trinervis.

L. tenerrima *R. S.* 2. 581. *m.* 2. 322. *E. a.* 1. 103. Eleusine tenerrima *Hornem. hafn.* 1. 79. *W. E. S.* 6. Hab. in China. ☉. C.

*Chloris cruciata* intermedia est inter *Chlorin* et *Leptochloam*, huic vero magis affinis.

## 27. DINEBA.

*Spicae* alternae, *spiculae distichae* multiflorae rachi adpressae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales e carina longe aristatae flosculis multo longiores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior mutica. *Styli* 2 penicillares.

### 110. D. ARABICA.

Caulis debilis. Folia ligula rotundata, lamina plana lata. *Spicae* breviusculae, rachi planiuscula margine viridi. *Spiculae* triflorae.

*D. arabica* Jacq. *R. S.* 2. 711. *m.* 2. 391. *E. a.* 1. 90. *Dineba aegyptiaca* Delil. *aegypt. t.* 11. *Dactylis paspaloides* W. E. 1. 111. *Cynosurus retroflexus* Vahl syn. 2. 20. W. sp. 2. 413. Hab. in Aegypto, Arabia. ☉. D.

## 28. CHLORIS.

*Spicae* fasciculatae et subfasciculatae. *Spiculae* multiflorae unilaterales solitariae biseriatae rachi adversae. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales acutatae, mucronulatae aut aristulatae; exterior minor. *Flosculi inferiores* 1—3 fertiles, superiores pedicellati imperfecti. *Gluma* bivalvis, valva exterior sub apice mutica, mucronulata aut sub apice aristata basi fasciculis pilorum duobus.

*Div. 1. Glumella mutica aut mucronulata.*

## 111. CHL. PETRAEA.

Spicae 3—7 arrectae. Valva interior mucronulata. Valvula exterior mucronulata, interior ciliata.

Chl. petraea Thunb. *W. E.* 1028. Eustachys petraea Desvauz R. S. 2. 313. m. 2. 341. E. a. 1. 105. Hab. in America boreali calidiore et Prom. b. sp. ☉. T. Glumella brunnea fit nec gluma.

## 112. CHL. SUBMUTICA.

Spicae 5—8—10 patentes. Valvae lineares acutatae, interior duplo longior. Flos fertilis 1, valvula exterior subemarginata sub apice mucronulata.

Chl. submutica Humb. et Runth nov. gen. et sp. 1. 135. t. 50. Eustachys submutica R. S. 2. 614. Hab. in temperatis convallis Mexicanæ ad littora lacus Tezcucensis, nos habemus e Brasilia. 2. C. Folia scaberrima, ligulae loco pili. Valvae dorso scabrae violaceo-fuscescentes. Valvula exterior dorso et nervis marginalibus scabris violaceis, interior subaequalis nervis submarginalibus scabris.

## 113. CHL. DISTICHOPHYLLA.

Spicae 12 et plures arrectae. Valvae ovales obtusae, interior sub apice aristulata. Valvula exterior fl. fertilis mutica obtusa nervo submarginali dense ciliato.

Chl. distichophylla Lagasc. nov. gen. et sp. n. 4. R. S. 2. 612. Hab. in planitie bonariensi et Chile. 2. T. Caulis compressus. Folia ad nodos conferta margine scabra, vagina compressa, ligula vix ulla. Spicae approximatae, rachis scabra. Valva exterior

oblonga acuta laevis glabra; interior obtusa emarginata lin. longa subscabra e carina elevata aristata, arista valva parum brevior; post florescentiam valvae interiores patent, exteriores arrectae sunt. Flosculi fertiles duo. Valvula ext. triangularis flavescens subemarginata, carina haud elevata subciliata, nervis marginalibus ciliis densis albis; interior subaequalis nervis submarginalibus subciliatis. Flosculus sterilis 1 minor, valvula ext. haud ciliata.

*Div. 2. Glumella aristata.*

114. CHL. RADIATA.

Spicae permultae arrectae. Valvula exterior floris perfecti lanceolata longe aristata, *imperfecti brevius aristata.*

Chl. radiata Swartz *R. S.* 2. 606. *W. E.* 1029. *E. a.* 1. 104. Agrostis radiata Linn. *sp.* 94. Andropogon fasciculatus Linn. *sp.* 1483. Hab. in America calidiore. ☉. C.

115. CHL. BARBATA.

Spicae 5—10 arrectae. Valvula exterior floris perfecti medio dilatata antice longe ciliata sub apice longe aristata; *imperfecti truncata glabra brevius aristata.*

Chl. barbata Swartz *R. S.* 2. 608. *m.* 2. 338. *E. a.* 1. 104. Hab. in India orientali. ☉. C. Valvae valvulae aristaeque purpurascens.

116. CHL. PALLIDA.

Spicae plures quam 7 arrectae. Valvula ext. floris perfecti medio dilatata latere utrinque sulco lon-

gitudinali antice ciliata sub apice longe aristata; *imperfecti truncata glabra brevius aristata.*

Chl. pallida *W. sp.* 4. 926. *W. E.* 1029. *E. a.* 1. 104 (affin. sequenti legendum). *R. S.* 2. 607. *m.* 2. 338. *Andropogon provincialis.* ☉. T. Valvae valvulaeque *pallidae* nec fuscae ut in praecedente. Speciem secundum *Herb. Willd.* determinavi. *Andropogon provincialis* secundum descriptionem certe non hujus loci. Est in *Herb. Willd.* species nomine *Androp. provinc.* incerto auctore quae utique differt, cum descriptione convenit et propriam sistit speciem.

#### 117. CHL. POLYDACTYLA.

Spicae permultae arrectae. Valvula exterior floris perfecti truncata margine longe carina brevius ciliata longe aristata; *floris imperfecti glabra brevius aristata.*

Chl. polydactyla *Swartz W. E.* 1029. *E. a.* 1. 104. *R. S.* 2. 608. *m.* 2. 339. (*excl. syn.*). Chl. compressa *De Cand. R. S.* 2. 609. *m.* 2. 339. *E. a.* 1. 105. Hab. in America calidiore. ☉. C. Character in *E. a.* 1. 104. additus ad Chl. barbatam pertinet, confusione typographi huc relata.

#### 118. CHL. CILIATA.

Spicae quinae arrectae. Valva exterior floris perfecti dilatata obtusissima et carina et margine longe ciliata aristata; *florum imperfectorum margine superiore membranaceo tumido glabro, non minus aristata.*

Chl. ciliata *Swartz W. E.* 1028. *E. a.* 1. 105. *R. S.* 2. 606. *m.* 2. 337. Hab. in aridis Jamaicae et Antillarum aliarum, ☉. C.

## 119. CHL. INFLATA.

Spicae permultae arrectae. Valvula exterior floris perfecti rotundata longe ciliata aristata, *florum imperfectorum inflato-concava non minus aristata.*

Chl. inflata *E. a.* 1. 105. *R. S. m.* 2. 339. Hab. in California ubi legit de Chamisso. ☉. C.

## 120. CHL. TRUNCATA.

Spicae multae patentes; spiculae subuniseriatae pedicellatae. Valva exterior floris perfecti obtusissima glabra basi longe attenuata aristata, *floris imperfecti marginibus inflexis brevius aristata.*

Chl. truncata *R. Brown. Pr. fl. N. Holl.* 1. 186. *R. S.* 2. 610. [Chl. dolichostachya *Lagasc. Spreng. Entd.* 3. 116. *R. S. m.* 2. 340. Chl. megastachya *Schrad. R. S. m.* 2. 330. Hab. in Nova, Hollandia. 24. C. Folia basi ciliis paucis longis. Spicae ad 6 poll. longae, aristae ad 6 lin. longa cum valvulis quae fere 2 lin. longae.

## 29. DACTYLOCTENIUM.

Spicae fasciculatae. Spiculae multiflorae unilaterales solitariae *quadriseriatae deflexae sibi adpressae.* Gluma bivalvis, valvae subaequales saepe mucronato-aristatae, *interior extrorsum versa longius aristata.* Glumella bivalvis, valvula exterior ex apice mucronato-aristata. *Parapetala* 2 brevia obtusa.

## 121. D. AEGYPTIACUM.

Folia subundulata margine scaberrima pilis sparsis bulbosis. Spicae 4—5 *patentissimae.* Arista valvulam subaequans subreflexa.

*D. aegyptiacum* *W. E.* 1029. *R. S.* 2. 583. *m.* 2. 325. *E. a.* 1. 104. *Cynosurus aegyptius* *Linn. sp.* 106. *Eleusine aegyptiaca* *Pers.* 1. 87. Hab. in Europa australi, Aegypto et Africa boreali, America calidiore. ☉. T.

122. *D. PROSTRATUM.*

Folia subundulata ciliata et pilosa pilis basi bulbosis. *Spicae 2 arrectae.* Arista valva brevior.

*Chloris prostrata* *Poir. W. E.* 1029. *R. S.* 2. 612. Hab. in India. ☉. C. Nostra secundum relationem e Congo. Valde affinis praecedenti, minus, bulbis pilorum crassioribus, spicis 2. An varietas? Convenit utique cum planta in *Herb. Willd.* ut mirum sit, Auctorem gramen ad *Chlorin* retulisse.

123. *D. MUCRONATUM.*

Folia *brevia* pilosa pilis bulbosis margine scabra. *Spicae 4 subpatentes, rachi apice nuda.* Valvulae *carina scabra*; arista valvula fere longior.

*Rhabdochloa mucronata* *Beauv. R. S.* 2. 618. *m.* 2. 343. *Chloris mucronata* *Michaux Pers. syn.* 1. *Pursh. am.* 1. 88. *Eleusine cruciata* *Lam. ill. t.* 48. *f.* 2. Hab. a. Virginia ad Georgiam in cultis. ☉. T.

124. *D. ARISTATUM.*

Folia *longa* pilosa pilis basi parum bulbosis margine scabra. *Spicae 5 subpatentes, rachi apice nuda acuta.* Valvulae *carina laevi*; arista valvula fere longior.

Hab. in Aegypto. *Ehrenb.* Simillima praecedenti. Caulis ejusdem magnitudinis 6 poll. altus. Folia caulis longitudine et longiora parum ultra lin. lata longa

- breviter acutata. Spicae 4—5 lin. longae in pr. 8 lin., apex nudus in nostra brevior.

### 30. ELEUSINE.

*Spicae fasciculatae, spiculae multiflorae sibi rachique adpressae. Gluma bivalvis, valva exterior minor introrsum versa. Glumella bivalvis, valvula exterior mutica. Parapetala 2 obtusa. Perigynium tenerum seminium cingens. Styli 2 penicillares.*

#### 125. E. CORACANA.

Spicae 3—5—7 *incurvae*; spiculae quadriseriatae 3—5—7 florum. Valvula exterior oblonga subtruncata. Seminium globosum.

El. coracana Gaertn. *W. E.* 2. 112. *E. a.* 1. 104. *R. S.* 2. 104. *m.* 2. 322. *Cynosurus coracanus* Linn. *syst.* 100. *Schreb. gr.* 2. 71. *t.* 35. Hab. culta in India orientali. ☉. C. Semina nigrescentia.

#### 126. E. OLIGOSTACHYA.

Spicae *binæ ternaeve strictae*. Spiculae quadriseriatae quinqueflorae. Valvula exterior oblonga acutiuscula. Semina *globosa*.

Hab. . . . ☉. C. Valde affinis praecedenti at minor, spicae paucae breviores. Vagina superne pilis sparsis in margine, lamina longa angusta 3 lin. lata. Spicae poll. et 2—4 lin. longae. Perigynia rufescentia magis ac in praecedente. Semina fusca.

#### 127. E. INDICA.

Spicae *quinae-septenae patentés*, spiculae 3—5 florum. Valvula exterior lanceolata obtusiuscula. Seminium *oblongum trigonum*.

El. indica *Gaertn. W. E. 11. 3. E. a. 1. 104.*  
*R. S. 2. 582. m. 2. 323. Cynosurus indicus Linn.*  
*sp. 106. Hab. in India, Aegypto etc. ☉. C.*

## 128. E. DISTANS.

*Spicae quinae patentes strictae, spiculae 5—7*  
*florae distantes. Valvula exterior lanceolata acutius-*  
*cula. Seminium oblongum trigonum.*

Hab. . . . ☉. C.

Valde affinis praecedenti et forte varietas at spi-  
 culae distantes ut spicae longiores strictae. Folia va-  
 gina glabra, lamina longissima angusta glabra. Spicae  
 3—4 poll. longae strictae. Spiculae ad tres lin. lon-  
 gae acutae. Seminium ut in praecedente oblongum  
 subtrigonum fuscum; perigynium e viridi flavescens.

## ERAGROSTIS NITIDA. Ehrenb.

## 31. BECKMANNIA.

*Panicula ramis ramulisque spicatis. Spiculae*  
*biflorae unilaterales solitariae biseriatae. Gluma*  
*flosculis brevior bivalvis, valvae aequales navicu-*  
*lares inaequaliter gibbae muticae. Glumella*  
*bivalvis, valvula exterior ex apice mucronata, in-*  
*terior implexa. Parapetala longa angusta. Styli*  
*plumosi basi pilosi.*

## 129. B. ERUCIFORMIS.

Folia saepe pubescentia scaberrima, ligula tripar-  
 titata. Spicae adpressae ternae lateralibus minoribus.  
 Arista valvula brevior.

B. eruciformis *Host gr. 3. 5. t. 6. W. E. 38.*  
*E. a. 1. 106. R. S. 2. 695. m. 2. 337. Phalaris eru-*

caeformis *Linn. sp.* 80. *Cynosurus erucaeformis*  
*Ait. W. sp.* 1. 412. Hab. in paludosis Europae au-  
 stralis orientalis et Orientis. 24. D.

---

## CHAMAGROSTIS.

v. i.

## DIPLACHNE.

v. i.

---

### Sectio III.

## PANICULATAE UNIFLORAE.

*Inflorescentia* paniculata terminalis monoclina. *Spiculae* uniflorae, villis non cinctae.

---

### Div. I. PHALARIDEAE.

*Inflorescentia* thyrsoides. *Valvula* utraque carinata aut convexa, rarius deficiens.

---

### 32. PHALARIS.

*Gluma* bivalvis, valvae carinatae aequales *glumella* longiores. *Valvae intermediae* 2, altera interdum minima, utraque interdum deficiens. *Glumella* bivalvis, valvulae carinatae muticae aequales, seminium incrustantes. Callus sub *glumella*.

Nervus valvarum medianus incurvus saepe in aristam transiens, nervi laterales recti apice evanescentes

nec cum mediano coadunati. *Styli* pilis distichis subpenicillares.

*Subgen. 1. VERAÆ.*

*Panicula spiciformis s. thyrsus.*

130. PH. CANARIENSIS.

Thyrsus ovalis. Valvae superne marginatae, margine integerrimo. Valvae *intermed. 2 subaequales glumella parum breviores.* Glumella pilis adpressis.

Ph. canariensis *Linn. W. E. 83. E. a. 1. 66. R. S. 2. 402. m. 2. 214. Schreb. gr. 1. 38. t. 10. f. 2. Host gr. 2. 28. t. 38.* Hab. in Europa australi inter segetes frequens. ☉. D.

131. PH. MINOR.

Thyrsus oblongus et cylindracens. Valvae superne marginatae *margine sublacero.* Valva *interm. altera minima, altera glumella triplo brevior.* Glumella pilis adpressis.

Ph. minor *Retz. W. E. 83.* Ph. aquatica *Aiton E. a. 1. 66. R. S. 2. 402. m. 2. 214. Host gr. 2. 29. t. 39.* Ph. capensis *W. E. 83. sec. herb.* Hab. in Europa australi inter segetes frequens. ☉. D.

132. PH. COERULESCENS.

Caulis *basi tuberascens.* Thyrsus oblongus et cylindricus. Valvae superne marginatae *margine lacero, apice subaristato.* Valvae *interm. obsoletae.* Glumella pilis raris.

Ph. coerulescens *Desfont. R. S. 2. 404. m. 2. 215. E. a. 1. 66.* Ph. tuberosa *Linn. R. S. 2. 404. Pers, syn. 1. 79.* Ph. bulbosa *Cavan. ic. 1. 64. Brot. lus. 1. 79. W. sp. 1. 327.* Ph. variegata *Spreng. n. Entdeck. 2. 101.* Ph. nitida *Presl. sicul. 12.* Ph.

aquatica *Linn. Am. 4. 264. sp. 79. excl. syn. Savi pis. 53. Sebast. et Maur. rom. 31.* Hab. in Africae borealis, Hispaniae, Lusitaniae agris. 24. T. Valvae locis siccis purpurascens.

### 133. PH. MICROSTACHYA.

Thyrus subcylindricus brevis. Valvae superne marginatae, *marginē integerrimo. Valv. interm. altera minima, altera corolla triplo brevior.* Glumella pitis adpressis.

Ph. miorostachya *Cand. R. S. 2. 402. m. 2. 214. E. a. 1. 66.* Ph. intermedia *Bosc. (fide spec. sicc. in Willd. herb.) R. S. 403. m. 2. 214.* Hab. in America boreali? (Pursh non habet) ☉. D.

### 134. PH. PARADOXA.

Thyrus cylindraceus. Valvae superne margine in laminam lanceolatam acutam producto, apice aristato. Valv. interm. obsoletae. Glumella pilis adpressis. Flores *neutri fertiles superiores cingentes et alii inferiores abbreviati imperfecti.*

Ph. paradoxa *Linn. W. E. S. 5. E. a. 1. 66. R. S. 2. 405. m. 2. 216. Schreb. gr. 1. 93. t. 12. Host gr. 2. 30. t. 40.* Hab. in Europae australis agris humidis. ☉. D.

### Subgen. 2. DIGRAPHIS.

*Panicula explicata. Fasciculi 2 pilorum loco valvarum intermediarum.*

### 135. PH. ARUNDINACEA.

Panicula ramis arrectis brevibus. Valvae acutae non marginatae. Valv. intermed. angustissimae longe pilosae glumella breviores. Glumella glabra.

Ph.

Ph. arundinacea *Linn. W. E.* 84. *E. a.* 1. 66.  
*R. S.* 2. 405. *m.* 2. 217. *Host gr.* 2. 25. *t.* 33. Hab.  
 ad aquas in Europa boreali et media. 4. D.

*Var. Picta*, foliis albo viridique striatis *Linn.*  
*R. S.* 2. 406. Colitur in hortis.

### 33. ACHNODON.

*Gluma* bivalvis, valvae *aequales* acutae *conniven-*  
*tes glumella longe majores. Glumella* bivalvis,  
 valvulae *aequales* muticae convexae membranaceae nervosae. *Pedicelli secundi floris rudimentum* ad dorsum valvulae interioris. Callus sub glumella.

Folia breviter aut breviuscula, ligula bipartita. Panicula exacte spiciformis. Gluma valvis lanceolatis nervosis, margine membranaceo. Glumellae valvulae membranaceae nervosae. Nervo mediano incurvo lateralibus rectiusculis cum mediano coadunatis.

#### 136. A. ARENARIUS.

Thyrus oblongus. Valvae carina *ciliatae*.

Achnodonton arenarium *Trin. gr. unifl.* 166.  
 Phleum arenarium *Linn. sp. ed.* 1. 60. *Schrad. germ.* 1. 189. Phalaris arenaria *W. sp.* 1. 328. Chilochoa arenaria *Beauv. R. S.* 2. 409. *m.* 2. 218. Hab. in Europae praesertim australis arenosis maritimis. ©. D. Flosculus ellipticus. Glumella perbrevis, valvulae truncatae denticulatae membranaceae nervis fuscescentibus.

#### 137. A. BELLARDI.

Thyrus cylindricus. Valvae carina *glabra* subscabra.

*Achnodonton Bellardi Beauv. R. S. 2. 381. m. 2. 207. Phleum Bellardi E. a. 1. 67. Phalaris Bellardi W. E. 85. Marsch. t. c. 1. 416. 3. 52. Phalaris bulbosa Linn. amoen. Bellard. Act. taur. 5. 213. Phalaris cylindrica Cand. fr. 3. 11. Achnodonton tenue Beauv. R. S. 2. 382. m. 2. 207. Phalaris tenuis Host gr. 2. 27. t. 36. Phleum tenue Schrad. germ. 1. 191. Hab. in Europae australis arenosis. ☉. D. Gluma et glumella ut in pr. at cilia nulla et nervi laterales valvarum a dorsali magis distantes.*

### KOELERIA.

*K. villosa v. i.*

### 34. PHLEUM.

*Gluma bivalvis, valvae carinatae aequales glumella longiores ex nervo primario aristatae. Glumella bivalvis, valvulae aequales muticae membranaceae saepissime convexae enerves. Styli semipenicillares.*

#### *Subgen. 1. GENUINAE.*

*Valvula interior convexa. Pedicellus ad valvulam interiorem nullus.*

*Panicula spiciformis. Ligula mediocris lacera. Calli rudimentum sub glumella utique adest. Valvae nervi laterales approximati ad aristam cum mediano combinati.*

### 138. PHL. PRATENSE.

*Thyrus cylindricus spiculis arrectis. Valvae carina ciliatae recta truncatae, arista valva brevior. Valvulae truncato-denticulatae.*

Phl. pratense *Linn. W. E.* 84. *E. a.* 1. 66. *R. S.* 2. 378. *m.* 2. 206. *Schreb. gr.* 1. 102. *t.* 14. *Host gr.* 3. 7. *t.* 9. Hab. in pratis siccis Europae. 2. D.

Var. *Nodosa*, caule basi tuberascente. Phl. nodosum *Linn. R. S.* 2. 377. Hab. in locis siccioribus.

## 139. PHL. ALPINUM.

Thyrus oblongus aut cylindraceus spiculis arrectis. Valvae carina longe ciliatae *oblique truncatae*, *arista valva longior recta*. Valvulae subtruncatae.

Phl. alpinum *Linn. W. E.* 84. *E. a.* 1. 67. *R. S.* 2. 379. *m.* 2. 206. *Host gr.* 3. 8. *t.* 10. Hab. in pratis alpinis Europae mediae. 2. D. Valvae margine plerumque rufescentes.

## 140. PHL. ECHINATUM.

Thyrus cylindraceus spiculis patentibus. Valvae basi carina longe ciliatae *recta truncatae*, *arista valva longior flexa*. Valvulae oblique truncatae denticulatae.

Phl. echinatum *Host gr.* 3. 8. *t.* 11. *R. S.* 2. 381. *m.* 2. 206. *E. a.* 1. 66. Phl. felinum *Smith. gr.* 1. 42. *R. S.* 2. 381. *m.* 2. 206. *E. a.* 1. 67. Hab. in Dalmatia (Host), in insula Zacyntho (Sibthorp). ♂. D.

Phl. echinatum in Horto minus erat Phl. felino. aristis brevioribus.

## Subgen. 2. CHILOCHLOA.

*Valvula interior dorso parum implexa. Pedicellus ad valvulam interiorem.*

## 141. PH. MICHELII.

Valvae lineares *sensim in aristam attenuatae*

*carina tota longe ciliatae.* Valvula exterior nervis superne scabriusculis.

Phleum Michelii *Allion. W. E.* 85. *E. a.* 1. 60. *R. S.* 1. 380. *m.* 2. 207. Phalaris alpina *Host gr.* 2. 26. *t.* 35. Hab. locis alpinis et subalpinis Europae mediae. 4. D. Folium summum lanceolatum, ligula mediocri lacera. Aristae longiusculae virentes. Valvulae colore aureo distinctae.

#### 142. PH. CUSPIDATUM.

Valvae lineares *sensim in aristam attenuatae carina superne longe ciliatae.* Valvula exterior nervis superne scabriusculis.

Phleum cuspidatum *W. E. S.* 5. *E. a.* 1. 67. Phalaris trigyna *Host gr.* 4. 12. *t.* 20. Chilochloa cuspidata *R. S.* 2. 409. Hab. in Tyrolia calidiore. 4. D. Folium summum lineare, ligula mediocri rotundata. Thyrsus gracilior ac in praecedente. Aristae breviusculae albentes. Valvulae virentes scabriusculae.

#### 143. PH. BOEHMERI.

Valvae subito in aristam attenuatae scabrae interdum carina subciliatae. Valvula undique pilis minutis adpressis.

Phleum Boehmeri *Schrad. W. E.* 86. *E. a.* 1. 67. Phleum laeve *Marsch. t. c.* 1. 46. Phalaris phleoides *Linn. Host gr.* 2. 26. *t.* 34. Chilochloa Boehmeri *Beauv. R. S.* 2. 408. *m.* 2. 218. Hab. in Europa media ad vias frequens. 4. D. Ligula brevis truncata. Valvulae virentes nervosae.

Var. habet glumam magis scabram et carina subciliatam, glumellam vero minus pilis inpersam.

Glumella saepe monstrose longe excrescit et concreseit.

*Subgen. 3. PHALARIDEA.*

*Valvula interior convexa dorso non implexa.*

*Pedicellus secundi floris minutus.*

144. PH. ASPERUM.

Valvae basi attenuatae superne ampliatae mucronatae scabrae. Valvula ext. pilis minutis adpressis, interior convexa.

Phleum asperum Jacq. *W. E.* 84. *E. a.* 1. 67.  
Phalaris aspera Retz. *W. sp. Host gr.* 2. 28. *t.* 37.  
Phleum ventricosum Moench. *meth.* 171. Chilo-  
chlôa aspera Beauv. *R. S.* 2. 409. *m.* 2. 218. Hab. in  
Europa media ad vias. ☉. D. Differt a congeneri-  
bus valvula interiore haud implexa sed convexa; val-  
vula utraque virens. Pedicellus secundi floris minu-  
tus, flore expanso caducus ut videtur. Ligula minus  
elongata ac in praecedentibus.

---

35. CRYPSIS.

*Gluma bivalvis, valvae carinatae inaequales, exterior minor, glumella breviores muticae. Glumella bivalvis, valvae inaequales, exterior major. Cal-  
lus o sub glumella. Stam. 2—3. Styli subpe-  
nicillares.*

Gramina multiramosa, ramis florentibus. Caulis decumbens. Folia vagina laxa, ligula brevissima ciliata. Panicula exacte spiciformis, saepe capitata. Valvula nervo mediano eminente.

## 145. CR. ACULEATA.

*Thyrus subglobosus vaginis foliorum duorum exceptus.* Valva utraque et valvula exterior dorso laeviusculae. Stam. 2.

Cr. aculeata *Aiton W. E. S. 5. E. a. 1. 67. R. S. 2. 376. m. 2. 204. Host gr. 1. 24. t. 31.* Schoenus aculeatus *Linn. Schreb. gr. 2. 62. t. 32.* Hab. in arenosis Europae australis. ☉. F.

## 146. CR. SCHOENOIDES.

*Thyrus cylindraceus vagina unius folii cinctus.* Valva utraque et valvula exterior dorso scabriusculae.

Cr. schoenoides *Aiton W. E. 85. E. a. 1. 67. R. S. 2. 375. m. 2. 204.* Phleum schoenoides *Linn. Jacq. ic. t. 30.* Heleochloa schoenoides *Host gr. 1. 23. t. 30.* Hab. in Europae australis arenosis. ☉. F.

## 147. CR. ALOPECUROIDES.

*Thyrus cylindricus e folii sumani vagina exsertus.* Valva utraque et valvula ext. dorso scabriusculae.

Cr. alopecuroides *Schrad. W. E. 86. E. a. 1. 67. R. S. 2. 375. m. 2. 203.* Phalaris explicata *Link Schrad. Journ. 1799 St. 4. 312* (Hostii opus nondum apparuerat). Heleochloa alopecuroides *Host. gr. 1. 23. t. 29.* Chilochloa explicata *R. S. 2. 419.* Hab. in arenosis Europae australis. ☉. F.

## 36. ALOPECURUS.

*Gluma bivalvis, valvae aequales carinatae basi saepe connatae, glumellam subaequantes. Glu-*

*mella univalvis*, arista basilaris, interdum deficiens. Callus o sub glumella. *Stylus* 1—2 pilosi.

Valvula magis nervosa quam valva ipsa.

## 148. A. PRATENSIS.

Caulis *non stoloniferus*. Vagina summa subinflata. Valvae *subaristulatae* pubescentes, *carina longe ciliatae* basi connatae. Valvulae acutae, basi marginibus connatae, arista valvam longe superans.

Al. *pratensis* Linn. *W. E. a.* 68. *R. S.* 2: 269. *m.* 2, 153. *Schreb. gr.* 1. 133. *t.* 19. *Host gr.* 2. 24. *r.* 31. Hab. in pratis Europae frequens. 4. D. Ligula mediocris rotundata subciliata saepe lacera.

## 149. A. NIGRICANS.

Caulis *stoloniferus*. Vagina summa subinflata. Valvae *subaristulatae* pubescentes *carina longe ciliatae*. Valvula acuta basi marginibus connatis, arista valvam magis minusve superans saepe abbreviata.

Al. *nigricans* Hornem. *W. E. S. 2. E. a.* 1. 168. *R. S.* 2. 270. *m.* 2. 153. Al. *nigrescens* Jacq. *ech.* 2. *t.* 13. Al. *ruthenicus* Weinmann *cat. h. Dorpat.* 1810. A. *repens* Marsch. *t. c.* 3. 54. A. *pratensis* *ruthenicus* Trin. *unifl.* 143. Hab. in pratis fertilioribus Russiae meridionalis. 4. D. Ligula mediocris rotundata saepe lacera. Glumae aetate saepe nigrescunt.

## 150. AL. LASIOSTACHYUS.

Vagina summa subinflata. Valvae *obtusiusculae undique villosae* basi connatae. Valvula obtusiuscula apice pubescens, arista valvam longe superans.

*Phalaris aristata Schousb. Willd. n. Schr. naturf. Frde. 3. 414. R. S. 2. 404. Hab. in Hispania. 2. T. Caulis altus. Folia longa angusta acutata striata basi laevissime pubescentia; ligula longiuscula rotundata pubescens.*

### 151. A. AGRESTIS.

Vagina summa subinflata. Valvae *apice membranaceo acuto carina scabrae* basi connatae. Valvula acuta basi marginibus connatis, *arista valva multo longior torta.*

*A. agrestis Linn. W. E. 86. E. a. 1. 68. R. S. 2. 272. m. 2. 154. Schreb. gr. 1. 140. t. 19. f. 2. Host gr. 3. 9. t. 12. Hab. in Europae mediae agris. 2. D. Nervi valvarum basi tantam hirti.*

### 152. A. GENICULATUS.

Vagina summa subinflata. Valvae *obtusae carina longe ciliatae* basi vix connatae. Valvula obtusa, *arista valvam parum superans.*

*A. geniculatus Linn. W. E. 16. E. a. 1. 68. R. S. 2. 273. m. 2. 135. Host gr. 2. 21. t. 32. Hab. in uliginosis Europae frequens. 2. D. Ligula longa acutiuscula.*

### 153. A. UTRICULATUS.

Vagina summa inflata. Valvae basi connatae *medio inflato-dilatatae*, apice lanceolato acuto, dorso ciliato-scabrae. Valvula acuta, *arista valvam longe superans. Styl. 1.*

*A. utriculatus Pers. W. E. 86. E. a. 1. 68. R. S. 2. 274. m. 2. 355. Phalaris utriculata Linn. Host gr. 3. 6. t. 7. Tozzettia Savi Mem. d. Soc. ital. 8. 2.*

477. *cfr. Usteri Annal.* 24. p. 80. Hab. in Europa australi praesertim orientali. ☉. D.

### 37. CORNUCOPIAE.

*Panicula* capitata basi inclusa *vagina truncata multidentata*. *Gluma* bivalvis, valvae aequales basi connatae glumella longiores. *Glumella* univalvis, valvula convexa basi connata. *Stylus* 1 bifidus, laciniis pilosis.

Glumella propria bivalvis est, valvula interior apice bifida seu excisa secundum longitudinem exteriori utriusque adnata est. Pedunculus singulari modo dilatatus.

### 154. C. CUCULLATUM.

Valvae obtusae emarginatae. Valvula truncata denticulata.

*C. cucullatum* *Linn. Schreb. gram.* 2. 89. t. 41. *Sibth. gr.* 1. 37. t. 51. *R. S.* 2. 251. Hab. in insulis Archipelagi, Smyrnae. ☉. T. Caulis geniculatus ramosus. Folia vagina laxa; ligula multidentata. Non video aristam a cl. Beauvois indicatam, nec Schreberus Triniusque indicant. An planta diversa? nam Beauvois sistit aristam sat magnam geniculatam facile dignoscendam.

### 38. COLOBACHNE.

*Gluma* bivalvis, valvae carinatae *subaequales* apice aristatae glumella longiores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior arista basilari, interior minor angusta. Callus o sub glumella. *Styli* 2 aut 1.

*Panicula* exacte spiciformis capitata.

## 155. C. VAGINATA.

Folia radicalia filiformia, caulinum brevissimum vagina inflata. Valvae hirsutae. *Arista glumellae valvis multo longior.*

C. vaginata *Beauv. R. S. 2. 374. m. 2. 204.* Polypogon vaginatus *Willd. Marsch. t. c. 1. 48. 3. 56.* Alopecurus angustifolius *Smith gr. 1. 43. Sibth. gr. 1. t. 64.* Alopecurus Pallasii *Trin. unifl. 146.* Habitat in Europa australi orientali et Oriente. 2. F. Valvula exterior truncata, nervo dorsi parum prominente, nervis duobus lateralibus viridibus, valvula interior inclusa exteriore parum minor angustissima longe acutata, carina viridi. Ligula mediocris rotundata.

## 156. C. GERARDI.

Folia plana vagina summi parum inflata. Valvae superne pilosae. *Arista glumellae valvis minor.*

Phleum etc. *Gerard. gallopr. 78. n. 4.* Phleum Gerardi *Jacq. ic. t. 301. R. S. 2. 380. m. 2. 206.* Alopecurus capitatus *Lam. ill. 168.* Alopecurus Gerardi *Vill. delph. 2. 66. c. fig. Trin. unifl. 146.* Hab. in Alpibus Europae australis. 2. F. Caulis basi tuberascens. Folia margine scabra, ligula truncata demum lacera. Glumella ut in pr. valvula exterior oblique truncata nervo dorsali prominente, duobus lateralibus viridibus; arista parva vix dimidiam valvulae longitudinem attingente; valvula interior inclusa exteriore parum minor angustissima longe acutata carina viridi. Stylus unicus.

---

## AMMOPHILA v. i.

Valvulam interiorem non implexam aut subimplexam habent ex aliis Subordinibus: Polypogon, Gastridium, Cinna, Sturmia, Colpodium.

*Div. 2. AGROSTIDEA.*

*Panicula* explicata. Glumella non pedicellata nec pilis stipata, valvula interior plerumque implexa. Stam. 2—3.

## 39. POLYPOGON.

*Gluma* bivalvis, valvae aequales glumella multo longiores, exterior sub apice, interior ex apice aristata. Glumella bivalvis, valvulae aequales convexae, exterior sub apice aristata. Callus parvus sub glumella. *Styli* plumosi.

*Panicula* coarctata. Nervus medianus valvae in aristam transit. Valvulae membranaceae enerves aut subenerves.

## 157. P. MONSPELIENSIS.

*Arista* valva multoties longior.

*P. monspeliensis* Desfont. *W. E.* 87. *E. a.* 1. 68. *R. S.* 2. 325. *m.* 2. 181. *Alopecurus monspeliensis* Linn. Schreb. *gram.* 1. 151. *t.* 20. *f.* 3. *Agrostis panicea* Host *gr.* 3. 32. *t.* 46. Hab. in Europa australi frequens. ☉. D. Caulis geniculatus. Folia scabra, ligula elongata bipartita. Valvae scabriusculae. Valvulae membranaceae, exterior denticulata, arista brevior quam aristae calycinae; interior minor.

## 158. P. LITTORALIS.

*Arista* valvae aequalis seu ipsa parum longior.

*P. littoralis* *Smith engl. Flora* 1. 88. *P. Lagascae* *Trin. unifl.* 170. *Agrostis littoralis* *R. S.* 2. 358. Hab. ad Angliae et Galliae littora. 2. D. Valde similis praecedenti at caulis repens, valvae longiores, aristae breviores. Aristae in hac parum ultra lin. longae, in illa 4 lin.

#### 40. GASTRIDIDIUM.

*Gluma* bivalvis, *valvae muticae subaequales*, *exterior paullo major*, *glumella multo longiores*. *Glumella* bivalvis, *valvulae aequales membranaceae*, exterior saepe sub apice aristata, interior superne subimplexa. *Pedicellus* interdum secundi floris ad dorsum valvulae interioris. *Calculus* parvus sub glumella. *Styli* penicillares.

Panicula spiciformis et subspiciformis. Valvae basi ventricosae ob glumellam brevissimam et germen crassius. Valvae subnerves.

#### 159. G. LENDIGERUM.

Panicula subspiciformis. Valvae longe acutatae. Valvula exterior denticulata pilosa, *arista glumae subaequalis*; interior glabra bifida.

*G. australe* *Beauv. R. S.* 2. 342. *m.* 2. 189. *E. a.* 1. 342. *Milium lendigerum* *Linn. W. E. S.* 5. *Host gr.* 3. 17. *t.* 24. Hab. in Europa australi. ☉. Ligula lacera. *Pedicellus* secundi floris sub pilis obtectus. *Penicilli* 2 pilorum sub flore.

#### 160. G. MUTICUM.

Panicula spiciformis. Valvae apice subfalcato. Valvula exterior apice denticulata *mutica* glabra, interior bifidu.

*G. muticum* Günth. Spreng. *E. a.* 1. 72. *R. S.* m. 2. 189. *G. scabrum* Presl. *sicul.* 21. *Gr. siculum* Trin. *unifl.* 169. Hab. in Sicilia. ☉. T. Ligula lacera. Deficit pedicellus secundi floris et penicilli pilorum vix ulli sub glumella.

## 41. AGROSTIS.

*Gluma* bivalvis, *valvae* subaequales, *exterior* major, *glumella* longiores. *Glumella* bivalvis, *valvulae* inaequales, *exterior* major arista saepe dorsali, *interior* saepe obsoleta. Callus sub glumella. *Styli* plumosi.

*Valvae* in tota genere uninerviae. *Valvulae* membranaceae utique nervosae.

*Div. 1. Genuinae. Valvula interior exteriore duplo brevior.*

## 161. A. STOLONIFERA.

*Panicula* arcta ad basin ramorum usque florifera. *Valvae* acutiusculae scabrae. *Valvula* exterior bifida, arista nulla, interior duplo minor truncata.

*A. stolonifera* Linn. Smith *W. E.* 96. *E. a.* 1. 70. *R. S.* 2. 343. m. 2. 189. *A. verticillata* Vill. delph. 2. 74. Trin. *unifl.* 195. *Vilfa stolonifera* Beauv. agr. 16. *Vilfa dulcis* Humb. Kunth nov. gen. et spec. 1. 138. Hab. in Europa australi frequens; in regno Mexicano. 24. D. Smith *engl. Flor.* 1. 93. nunc cum *A. alba* Schrad. combinat at *panicula* in hac minime arcta. *Ligula* elongata lacera.

## 162. A. FRONDOSA.

*Panicula* arcta ad basin ramulorum florifera. *Valvae* longe acutatae dorso scabrae. *Valvula*

exterior bifida, arista nulla, interior duplo minor truncata denticulata.

*A. frondosa* Tenor. neap. p. 350. *A. decumbens* Hall. fil. Gaudin Agrostogr. 1. 78. (excl. syn.) Hab. in Europa media. 2. D. Valde affinis praecedenti nec nisi valvis longe acutatis diversa. Ab. Agr. diffusa sat differt.

### 163. A. VULGARIS.

Panicula demum contracta. Valvae acutatae dorso superne exasperatae. Valvula exterior obtusa magis minusve denticulato-aristulata, arista interdum dorsali; interior duplo minor bifida.

*A. vulgaris* Smith W. E. 96. E. a. 1. 76. R. S. 2. 353. m. 2. 192. Host gr. 4. 34. t. 59. *A. capillaris* Leers herb. t. 4. f. 3. *A. alba* Linn. W. E. 96. E. a. 1. 70. R. S. 2. 346. m. 2. 190. *A. polymorpha* Trin. unifr. 195. *A. diffusa* Host gr. 4. 32. t. 35. *A. sylvatica* ibd. 33. t. 58. *A. decumbens* ibd. 31. t. 54. *A. varia* ibd. 33. t. 51; priores duae varietates muticae, posteriores aristatae. Hab. in Europa frequens. 2. D. *A. vulgaris* Smith ab Agr. alba Auct. non differt, ligula enim magis minusve elongata est quae solam fere differentiam efficit. Species quoque, ab Hostio propositae non discrepare videntur. Agr. stolonifera non confundenda cum Agr. vulgari, nec in Europa boreali occurrit.

### 164. A. CAPILLARIS.

Ligula elongata lacera. Panicula effusa ramis capillaribus. Valvae acutae laeves. Valvula exterior obtusa mutica, interior truncato-denticulata.

*A. capillaris* Linn. Smith R. S. 2. 346. m. 2. 190. Hab. in Europa australiori, in Lusitania frequens. 2. T.

## 165. A. RETROFACTA.

Ligula elongata lacera. Panicula effusa. Valvae longe acutatae dorso exasperatae. Valvulae subaequales totae pilosae, pilis brevibus, exterior arista dorsali glumam superante.

*A. retrofracta* W. E. 94. E. a. 1. 70. R. S. 2. 365. m. 2. 197. *Lachnagrostis Willdenowi* Trin. unifl. 217. Hab. in Nepalia. 2. C. Caulis erectus ramosus. Ab Agrostide non differt nisi glumella pilosa, hinc intermedia inter Agrostidem et Calamagrostidem. Fasciculi 2 pilosi quoque ad basin glumellae.

Div. 2. *Trichodia*. Valvula interior minima aut nulla.

## 166. AGR. CANINA.

Folia radicalia involuta, caulina plana; ligula elongata. Panicula effusa demum contracta. Valvae acutae, superne dorso scabrae. Valvula exterior acutiuscula, arista supra basin glumam superante; interior minima.

*Agrostis canina* Linn. W. sp. 1. 367. Host gr. 4. 31. t. 53. *Avena monantha* Leers herb. t. f. 2. *Trichodium caninum* Schrad. W. E. 97. E. a. 1. 69. R. S. 2. 277. m. 2. 155. Hab. in arenosis Europae borealis et mediae. 2. D. *Trichodium diffusum* E. a. 1. 69. est varietas cultura enata. Vagina foliorum laevis, lamina scabra. Glumella basi fasciculis 2 pilorum minutissimorum. Seminium glumella crustatum.

## 167. AGR. DECUMBENS.

Ligula elongata lacera. Panicula *effusa ramis tenerrimis*. Valvae acutatae *dorso superne scabrae*. Valvula *exterior acuta* mutica; interior obsoleta.

Agr. Michauxi *Trin. gr. unifl.* 206. Trichodium decumbens *Michaux R. S. 2. 282. m. 2. 158. E. a. 1. 69.* Hab. in America boreali. 24. D. F. Agrostis scabra *W. sp. 1. 370* non differt; omnia enim conveniunt et ligula in ipso specimine Willdenowiano elongata lacera. Trichodium laxiflorum *E. a. 1. 69.* ab Agr. decumbente non differt; laxiflorum americanum utique habet folia angustiora breviora. — Folia scabra. Glumella basi apophyses habet, cui pili innati esse solent, sed pilos vix ullos.

## 168. AGR. TENUIFOLIA.

Ligula brevis truncata. Panicula *demum contracta*. Valvae *longe acutatae dorso superne exasperatae*. Valvula *exterior acutiuscula* mutica, interior multo minor.

Agrostis tenuifolia *Marsch. t. c. 1. 58. 3. 61. R. S. 2. 48. Trin. gr. unifl.* 205. Hab. in monte Beschtai versus cacumen. 24. D. F. Folia *angusta brevia*.

## 169. AGR. ALPINA.

Folia radicalia convoluta, caulina plana, ligula elongata lacera. Panicula *erecta ramis laevibus*. Valva exterior *acuta superne scabra*, interior mucronata. Valvula *exterior denticulata aristulis binis*, infra medium arista dorsali glumam superante, interior minima.

*Agrostis alpina* *W.* *sp.* 1. 368. *Host gr.* 3. 34. *t.* 49. *Agrostis rupestris* *Mert. Koch germ.* 1. 514. *Trichodium alpinum* *Schrad. germ.* 1. 200. *t.* 3. *f.* 4. *W. E.* 98. *E. a.* 1. 69. *R. S.* 2. 278. *m.* 2. 156. Hab. in Alpibus Europae mediae. 4. F. Caulis 1—6 poll. longus. Gluma lin. longa. Fasciculi pilorum 2 ad basin glumellae. Seminium glumella non crustatum.

## 170. AGR. RUPESTRIS.

Folia radicalia convoluta, caulina plana et convoluta, ligula elongata lacera. Panicula *patens ramis scabris*. Valva ext. *acuta superne scabra*, interior mucronulata. Valvula *exterior denticulata biaristulata* supra basin arista glumam superante, interior minima.

*Agrostis rupestris* *W.* *sp.* 1. 201. *Host gr.* 3. 34. *t.* 50. *Agrostis alpina* *Mert. et Koch germ.* 1. 515. *Trichodium rupestre* *Schrad. germ.* 1. 201. *t.* 3. *f.* 5. *E. a.* 1. 69. *R. S.* 2. 279. *m.* 2. 186. Hab. in Europae alpibus. 4. D. F. Caulis ped. et ultra longus. Gluma 2—3 lin. longa. Fasciculus pilorum sat magnus loco valvulae interioris.

Var. filiformis. Folia caulina convoluta. *Agrostis filiformis* *Vill. delph.* 2. 76. *Trichodium filiforme* *Spreng. pag.* 1. 6. *Trichodium rupestre* *B. R. S.* 2. 239. *m.* 2. 156.

## 171. AGR. ELEGANS.

Ligula longa lacera, Panicula effusa ramis capillaribus. Valvae *obtusae laevissimae*. Valva exterior obtusa mutica, interior obsoleta.

*Agrostis elegans* *Thore. De Cand. fr.* 6. 252. *Trichodium elegans* *R. S.* 2. 283. *m.* 2. 139. *E. a.* 1. 69.

Hab. in Aquitania, Baetica. ☉. T. Similis Agrosti capillari at duplo minor et tenerior. Flosculi minuti.  
*Agr. tenella* v. *Calamagrostis tenella*.

#### 42. MUEHLENBERGIA.

*Gluma* bivalvis, *valvae minimae*. *Glumella* bivalvis, *valvulae aequales*, exterior sub apice aristata.

Genus affine sequenti.

#### 172. M. DIFFUSA.

Caulis ramosus repens. Folia breviter hirta, ligulae loco pili. Panicula contracta. Arista valvulae exterioris ipsius longitudine.

M. diffusa Schreb. *W. E.* 81. *E. a.* 1. 65. *R. S.* 2. 305. *m.* 2. 208. *Trin. unifl.* 188. *t.* 5. *f.* 2. *Dilepyrum multiflorum Mich. amer.* 1. 40. Hab. in collibus siccis Americae septentrionalis frequens (Pursh). 4. T.

#### 43. PODOSEMUM.

*Gluma* bivalvis, *valvae inaequales et subaequales*, exterior minor, *glumella* breviores, interdum ob apices acutatos longiores, interior subinde *glumellae aequalis*. *Glumella* sessilis bivalvis, *valvulae aequales*, exterior aut mutica aut sub apice mucronulata aut ex apice aristata.

Valvae minus nervosae quam valvulae.

#### Sectio 1. Aristatae.

#### 173. P. TENUIFLORUM.

Caulis subsimplex. Panicula tenuis, ramis adpressis. Valvae acutae subaequales dorso exasperatae

glumella breviores. Arista valvulae exterioris ipsa longior.

Muehlenbergia Willdenowi *Trin. unifl.* 188. t. 5. f. 3. Agrostis tenuiflora *W. E.* 94. *hort. t.* 12. *E. a.* 1. 71. *R. S.* 2. 372. *m.* 2. 201. Hab. in Virginia et Carolina ad ripas (Pursh). Fol. ad 4 lin. lata, ligula brevissima. Valvae latae membranaceae, nervo viridi.

*Sect. 2. Sub apice mucronulatae.*

174. P. SOBOLIFERUM.

Caulis *diffusus ramosissimus*, stolones repentes. Panicula tenuis ramis adpressis. Valvae acuminatae subaequales dorso exasperatae glumella breviores. Valvula exterior sub apice mucronulata.

Muehlenbergia sobolifera *Trin. unifl.* 189. t. 5. f. 4. Agrostis sobolifera *W. E.* 95. *R. S.* 2. 364. *m.* 2. 197. Cinna sobolifera *E. a.* 2. 81. Hab. in Pensylvania (Muehlenb.). 4. T. Folia longiora angustiora ac in pr. ligula brevis. Valvae ut in pr. angustiores, longius acutatae.

*Sect. 3. Muticae.*

175. P. FOLIOSUM.

Caulis erectus ramosus. Panicula *ramis adpressis densis*. Valvae longe acutatae subaequales dorso exasperatae glumella breviores. Valvula exterior apice longe acutata ut quasi aristata, interior acuta.

Muehlenbergia foliosa *Trin. unifl.* 190. Agrostis foliosa *R. S.* 2. 373. *m.* 2. 202. Agrostis filiformis *W. E.* 95. Cinna filiformis *E. a.* 1. 76. Hab. in America boreali ad ripas Canectogae (Muehlenb.).

4. T. Fol. 3 lin. lata brevia, ligula abbreviata. Panicula ramis ad basin floriferis.

#### 176. P. MEXICANUM.

Caulis erectus basi ramosus stoloniferus. Panicula *ramis subadpressis densis*. Valvae acutatae inaequales dorso scabrae subciliatae glumella breviores. Valvulae acutatae dorso scabrae subciliatae.

Muehlenbergia mexicana *Linn. W. E. 97. R. S. 2. 373. m. 2. 201.* Cinna mexicana *E. a. 1. 71.* Hab. in America boreali, Virginia (Pursh.) nec in calidiore. 4. D. Caulis *basi tantum ramosus*, qui in praeced. totus ramosus. Folia *longiora angustiora*, ligula brevissima.

#### 177. P. GLOMERATUM.

Caulis ramosus basi repens. Panicula *ramis adpressis brevibus densis, basi vagina inclusa*. Valvae longe acutatae subaequales dorso scabrae apicibus glumellam superantes. Valvulae longe acutatae dorso scabrae, exterior paullo major.

Muehlenbergia glomerata *Trin. unifl. 191. t. 5. f. 10.* Polypogon glomeratus *W. E. 1. 37. E. a. 1. 68. R. S. 2. 326. m. 2. 182.* Polypogon setosus *Spreng. mant. 1. 31. R. S. 2. 327. m. 2. 182.* Hab. in Pennsylvania (Muehlenb.). 4. D. Folia *longa* paniculas saepe superantia aut aequantia, ligula brevis ciliata. Flosculi neutri saepe hermaphroditis mixti.

#### 178. P. PUNGENS.

Caulis ramosus. Folia *convoluta brevia rigida disticha*. Panicula *arcta densa*. Valvae acutae superne scabriusculae, interior glumellam aequans. Valvulae nervosae muticae.

*Vilfa pungens Trin. unifl.* 155. *Agrostis pungens Schreb. gram.* 2. 46. *t.* 27. *f.* 3. *R. S.* 2. 355. *m.* 2. 195. Hab. in maritimis Europae australis. 24. F. Folia ad oras vaginae pilosa. Glumellae pedicellus brevissimus crassus callo nullo, qualis et in praecedentibus occurrit; valvula interior pedicello proprio tenuiori.

## 179. P. VIRGINICUM.

Caulis ramosus. *Folia convoluta filiformia.* Panicula arcta ramis paucis appressis. Valvae acutae laeviusculae, interior glumellam aequans. Valvulae nervosae muticae.

*Vilfa virginica Trin. unifl.* 155. *Agrostis virginica Linn. Willd. sp.* 1. 373. *R. S.* 2. 354. *m.* 2. 194. Hab. . . . an planta Brownii eadem?

## POA.

*P. serotina uniflora.*

v. i.

## 44. ANEMAGROSTIS.

*Gluma bivalvis, valvae inaequales exterior minor, interior glumella parum longior. Glumella bivalvis, valvula exterior sub apice aristata, interior inclusa; pedicellus secundi floris ad dorsum valvulae interioris. Styli plumosi.*

Glumella basi fasciculis duobus pilorum minorum.

## 180. A. SPICA VENTI.

Panicula effusa. Valvae dorso exasperatae. Valvulae pilis minutis scabrae; arista valva multo longior.

A. spica venti a. f. b. *Trin. gr. unifl.* 215. *Agrostis* spica venti *Linn. W. E.* 94. *E. a.* 1. 70. *Host gr.* 3. 32. *t.* 47. *R. S.* 2. 369. *m.* 2. 200. Hab. inter segetes Europae borealis et mediae. ☉. D. Ligula longa lacera;

#### 181. A. INTERRUPTA.

*Panicula contracta.* Valvae dorso exasperatae. Valvulae pilis minutis scabrae; arista valva multo longior.

A. spica venti c. *Trin. unifl.* 215. *Agrostis* interrupta *Linn. W. E.* 94. *E. a.* 1. 70. *Host gr.* 3. 33. *t.* 48. *R. S.* 2. 370. *m.* 2. 201. Hab. ad vias Europae mediae et australis. ☉. D. Ligula ut in praec. longa lacera.

#### 45. CINNA.

*Gluma* bivalvis, valvae inaequales exterior minor, interior *glumellae* aequalis. *Glumella* bivalvis *pedicellata*, valvulae aequales, exterior sub apice aristata, int. *carinata non implexa*.

#### 182. C. ARUNDINACEA.

*Panicula* nutans subeffusa, ramis densis. Valvae acutatae dorso scabriusculae. Valvulae laeves.

C. arundinacea *Linn. W. sp.* 1. 21. *E. a.* 1. 70. *Agrostis* Cinna *Linn. W. E.* 95. *R. S.* 2. 373. *m.* 2. 202. *Muehlenbergia* Cinna *Trin. unifl.* 191. Hab. in America boreali a Canada ad Carolinam, in littoribus (Pursh). 4. D. Folia longa lata ultra 6 lin. valde scabra, ligula longa lacera. Valva ext. uninervia, interior trinervia.







## 48. SCHMIDTIA.

*Panicula ramulis umbellatis bracteatis. Gluma* bivalvis, valvae inaequales, exterior longior apice aristulata ob aristam corolla longior; interior minor mutica. *Glumella* univalvis, valvula mutica. Stam. 2. Styli plumosi.

## 189. SCH. SUBTILIS.

Caulis debilis. Folia vagina laxa, ligula longiuscula lacera.

Schm. subtilis *Trattinn. austr. 1. 12. t. 451.* Coleanthus subtilis *R. S. 2. m. 2. 156.* Habitat in Germania australi, Bohemia. ☉. D. Seminium pro flore maximum.

## 49. COLPODIUM.

*Gluma* bivalvis, valvae aequales, *glumella* parum breviores. *Glumella* bivalvis, valvulae aequales, exterior convexa carinata, interior planiuscula apice subimplexa, utraque mutica. Styli plumosi.

## 190. C. STEVENI.

Valvae obtusiusculae apice rubente. Valvulae denticulatae apice diaphanae.

C. Steveni *Trin. agrost. 119. t. 7.* Agrostis versicolor *Steven R. S. 2. 359.* Hab. in summis alpibus Schahdagh et Tyfendagh. 4. T. Caulis erectus. Folia laevia, ligula elongata. Panicula ramis fasciculatis patentibus. Valvulae pubescentes. Elegans gramen, ob apices corollae diaphanos albissimos supra limbum purpureum glumae prominentes.





in Europa australi. 24. T. *Flosculus sine aristis* 4 lin. longus. Ligula brevis lacera.

## 195. U. MULTIFLORA.

*Panicula effusa*. Valvae acutae. Valvulae obtusiusculae, arista glumam longe superans; pedicellus brevissimus crassus.

U. parviflora *Trin. unifl.* 173. Piptatherum multiflorum *Beauv. R. S.* 2. 329. m. 2. 183. Milium multiflorum *Schrad. W. E.* 34. E. a. 1. 72. Milium arundinaceum *Sibth. gr.* 1. 50. t. 66. Agrostis mi-  
liacea *Linn. W. sp.* 1. 363. Hab. in Europa australi. 24. D. *Flosculus sine aristis* lin. longus. Valvula ext. interiorum non plane includit. Valvae et valvulae glabrae.

## 196. U. FRUTESCENS.

*Panicula effusa verticillata, radiis inferioribus sterilibus brevibus*. Valvae acutae. Valvulae obtusae, arista glumam non superans.

Milium frutescens *E. a.* 1. 72 (arista basilaris dicta lapsu calami). M. arundinaceum *Sieb. exsicc.* non vero *Sibth. gr.* Hab. in Creta. 24. T. Ab U. multiflora cum qua confundere videtur *Schult. mant.* 2. 183. sat differt. Fol. glabra, vagina laevi, lamina angustissima, ligula brevissima.

## 197. U. COERULESCENS.

Folia lamina convoluta. *Panicula subeffusa*. Valvae acutae. Valvulae obtusae, arista glumam non superans. U. coerulescens *Trin. unifl.* 172. Piptatherum coerulescens *Beauv. R. S.* 2. 328. m. 2. 138. Milium coerulescens *Desfont. atl.* 1. 66. t. 12. Hab. in Africa boreali et Europa australi. 24. T.

*Gluma* 4 lin. longa, valvae coerulescentes. Valvula interior fuscescit. Ligula brevis lacera.

Subgen. 2. ORYZOPSIS.

*Panicula ramis simplicibus paucifloris adpressis.*

198. U. MELANOSPERMA. \*

Valvae nervosae scabriusculae breviacuminatae. Valvulae obtusae demum fusco-nigrae, pilis sparsis basi magis confertis.

U. racemosa *Trin. unifl.* 172. Milium racemosum *Smith in Rees Cyclop.* Oryzopsis asperifolia *Michaux. W. E.* 81. *E. a.* 1. 41. *R. S.* 2. 264. *m.* 2. 151. Hab. a sinu Hudsonis ad Quebec usque in montibus. 2. F. Folia plana scabra, ligula vix ulla. Gluma 4 lin. longa, valvae e flavescenti virides. Glumella paullo minor arista 8 lin. longa.

Trinius synon. Michauxi et VahlII ad sequentem reduxit speciem. Quamquam de colore seminis nil dicant, tamen Muehlenbergius melanocarpam suam cum asperifolia Mxi. conjungit, et specimina nostra hortensia a Muehlenberg olim accepta ad melanocarpam referenda.

199. U. LEUCOSPERMA.

Valvae nervosae scabriusculae breviacuminatae. Valvulae obtusae demum albentes, pilis sparsis basi magis confertis.

U. asperifolia *Trin. unifl.* 172. Hab. in Albany, New York. 2. F. Praecedenti simillima nec nisi colore seminis diversa. Folia paullo latiora videntur. Florescentia praecocior. Multo rarior in America boreali videtur quam praecedens.

A. S. H. uses melanocarpa  
See Manual

## Div. (Fam.) IV. STIPACEAE.

*Glumella* pedicello conico acuto.

## 52. ARISTIDA.

*Gluma* bivalvis, valvae inaequales exterior minor, glumellam subaequant. *Glumella* bivalvis, valvula exterior *apice aristis ternis aut arista ternata*, interior brevior acuta.

Chaetariam ab Aristida seperavit Beauvois ob setas tres, cum in Aristida seta media arista sit. Sed distinctio inter setam et aristam omnino falsa.

## 200. A. COERULESCENS.

Folia convoluta, ligula brevissima ciliata. Panicula *ramis arrectis spiculis aggregatis*. Valvae longe acutatae *glumella breviores*. Glumella basi pilosa, valvula exterior coerulescens *apice aristis ternis subaequalibus valvula longioribus*.

*A. coerulescens* Desfont. atl. 1. 109. t. 21. E. a. 1. 43. *A. canariensis* W. E. 99. Chetaria coerulescens Beauv. R. S. 2. 394. m. 2. 211. Hab. in Africa boreali, Hispania australi, Oriente. 2. T. Aristae cum glumella ultra poll. longa. *A. canariensis* e Teneriffa habet glumellam cum aristis minorem 10 lin. longam.

## 201. A. DIVARICATA.

Folia scabra, vagina ad oras pilosa, ligula truncata brevissima. Panicula *ramis simplicibus divaricatis, pedicellis incrassatis*. Valvae longe acutatae, exterior includens interiorem, *glumella longior*, utraque

dorso exasperata. Valvula exterior *apice aristis ternis scabris media longiore.*

A. divaricata *W. E.* 99. *Chaetaria divaricata R. S.* 2. 392. *m.* 2. 211. *E. a.* 1. 73. Hab. in Americae australi? 2. C. Spicula cum aristis poll. longa. Non convenit descriptio in *Humb. et Kunth. nov. gen. et. sp.* 1. 120., nec *Trinii unifr.* 176. qui A. canariensem Willd. cum A. divaricata Jacq. Ecl. combinat. In Herb. Willdenow. non est.

### 53. STIPA.

*Gluma* bivalvis, valvae aequales aut subaequales glumella longiores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior convoluta ex apice aut sub apice aristata *arista articulata basi torta*; interior implexa. Antherae nudaе.

### 202. ST. PENNATA.

Ligula elongata obtusiuscula. Panicula ramis arrectis. Valvae subaequales, interior apice longe acutata. Valvula exterior basi pilosa, lineis pilosis, arista *longissima* basi scabra, *antere parte dependente plumosa.*

St. pennata *Linn. W. E.* 98. *E. a.* 1. 73. *R. S.* 2. 331. *m.* 2. 185. *Host gr.* 4. 19. *t.* 33. Hab. in arenosis Europae mediae. 2. D. Aristae ad ped. longae.

### 203. ST. CAPILLATA.

Ligula bipartita acuta. Panicula ramis arrectis *basi vagina folii summi excepta.* Valvae subaequales,

les, utraque longe acutata. Valvula exterior basi pilosa ciliata, lineis parum pilosis, arista *longissima anteriore parte conflexa, tota scabra*.

St. capillata *Linn. W. E. 98. E. a. 1. 73. R. S. 2. 333. m. 2. 186.* Hab. in arenosis Europae mediae.  
4. Arista 6-7 poll. longa.

## 204. ST. GIGANTEA.

Ligula obtusa pilosa. Panicula composita *e foliis emersa*. Valvae subaequales, utraque longe acutata. Valvula exterior basi pilosa, lineis pilosis, arista *longissima basi tortâ anteriore parte conflexa, tota scabra*.

St. gigantea *Lagasc. nov. gen. et sp. 3. R. S. 2. 333.* Hab. in Hispania. 4. T. Affinis praecedenti sed major, panicula magis ampla, *aristis 9 poll. longis*.

## 205. ST. TORTILIS.

Ligula brevis ciliata. *Panicula simplex* basi vagina folii summi excepta. Valvae membranaceae aequales, utraque longe acutata. Valvula exterior pubescens, arista *elongata basi gyris densis subpubescentibus margine ciliatis, anteriore parte recta scabra*.

St. tortilis *Desfont. W. E. 99. E. a. 1. 73. R. S. 2. 332. m. 2. 185.* St. humilis *Brotero. 1. 86.* St. paleacea *Vahl symb. 2. 24. W. sp. 1. 441. Smith gr. 1. 65.* St. seminuda *Hornem. hafn. 1. 76.* Hab. in Europa australiori. 4. T. Arista 4-5 poll. longa bis fracta, glumella ipsa 4—5 lin. longa.

## 206. ST. ARENARIA.

Ligula longa lacera pilosa. Panicula ramis arrectis. Valva interior breviaristata. Valvula exterior

pilosa bifida, *arista ex divisione laxe torta longa scabra* semel fracta.

St. arenaria *Broter. phytogr. lus. n. 6. fl. lus. 1. 86.* St. gigantea *Liuk Schrad. Journ. 1799. 4. 313.* (primum nomen). Avena *Cavanillesii Lagasc. R. S. 2. 677. m. 2. 375.* Hab. in collibus arenosis Hispaniae, Lusitaniae. 4. T. *Aristae pars inferior poll. 8 lin. longa superior poll. 6 lin.*

### 207. ST. TENACISSIMA.

Folia basi et ad oras vaginae lanata. *Panicula contracta.* Valvae subaequales longe acutatae in aristam attenuatae. Valvula exterior pilis seriatis, *arista laxe torta pilis longis densis semel fracta apice scabra.*

St. tenacissima *Linn. W. E. 99. E. a. 1. 73. R. S. 2. 334. m. 2. 186.* Hab. in Hispania, Lusitania. 4. T. *Aristae pars inferior 10 lin. longa, superior poll. 2 lin.*

### 208. ST. ARISTELLA.

Ligula brevis ciliata. *Panicula simplex.* Valvae nervosae, interior breviaristata. Valvula basi pilosa pilis sparsis. *Arista flexuosa non geniculata sub apice inserta* scabra glumella duplo longior.

St. Aristella *Linn. W. E. 99. E. a. 1. 73. R. S. 2. 334. m. 2. 186. Host gr. 4. 20. t. 34. Sibth. gr. 1. 69. t. 87.* Hab. in Europa australi. 4. T. *Arista tota 10 lin. longa.*

### 209. ST. STRIATA.

Folia lamina plana, ligula truncata. *Panicula simplex.* Valvae subaequales longe acutatae, exterior

longior, arista apicis brevi. Valvula pilis arrectis, *arista gyris laxis semel fracta tota scabra.*

Hab. in Australia? 4. T. Folia vagina striata levi, lamina 1—2 lin. lata striata antrorsum scabra. Valva exterior major 6 lin. longa, interior paullulum minor. Valvula fusco-nigra; arista ad geniculum usque 6—8 lin. longa ultra ipsum non multo longior.

## 54. LASIAGROSTIS.

*Gluma* bivalvis, valvæ subaequales glumella longiores. *Glumella* bivalvis, valvula ext. convexa ex apice aut sub apice aristata, arista non articulata basi parum torta; interior planiuscula. *Antherae* apice fasciculo pilorum brevi.

### 210. L. CALAMAGROSTIS.

Valvulae lanceolatae acuminatae acumine tenui. Valvula exterior duplo longior pilosissima pilis longitudine glumae.

*Calamagrostis speciosa* Host gr. 4. 23. t. 45. *Stipa Calamagrostis* Wahlenb. helv. 25. Trin. unifl. 183. *Arnundo speciosa* Schrad. germ. 1. 219. t. 5. f. 9. W. E. 128. E. a. 1. 74. *Agrostis Calamagrostis* Linn. R. S. 2. 362. m. 2. 197. Habitat in Europae mediae montosis. 4. D.

## Div. V. ARUNDINACEAE.

Pili glumellam stipantes.

## 55. CALAMAGROSTIS.

*Gluma* bivalvis, valvae *convexae* subaequales et inaequales, *exterior major*, glumella majores.

*Glumella* bivalvis, valvulae inaequales basi pilis stipatae membranaceae nervosae. *Styli* 2 plumosi.

Pili exteriores ad ipsam basin valvulae exterioris positi sunt; pili interiores in processibus pedicelli duobus parvis lateralibus fasciculos formant, inter quos tertius saepe processus variae magnitudinis ad basin valvulae interioris emergit.

*Div. 1. Arista dorsalis.*

## 211. C. EPIGEOS.

Panicula conglomerata. Valvae subaequales lineares longe acutatae glumella duplo fere longiores. Valvula exterior duplo fere major interiore, *arista valvulam longe pilos et glumam minime superans; pili longitudine glumae.*

*C. epigeios* Roth Host gr. 4. 24. t. 42. Trin. unifl. 220. t. 4. f. 5. Arundo epigeios Linn. W. E. 126. E. a. 1. 73. R. S. 2. 501. m. 2. 285. Schrad. germ. 1. 211. t. 4. f. 1. Hab. in Europae borealis et mediae arenosis. 4. Folia scaberrima. Valvae dorso scabrae. Valvula bifida denticulata. Processus piliferus nullus.

## 212. C. HALLERIANA.

Valvae subaequales oblongo-lanceolatae acutatae glumella parum longiores. Valvula ext. duplo fere major interiore, *arista valvulam et pilos parum superans; pili longitudine glumellae.*

C. Halleriana *Trin. unifl.* 221. *t.* 4. *f.* 6. Arundo Pseudo Phragmites *Schrad. germ.* 1. 213. *t.* 4. *f.* 3. *R. S.* 2. 503. *m.* 2. 286. Arundo Halleriana *Gaud. helv.* 47. Hab. in Europa media et boreali. 2. D. Folia in nostra scaberrima pilis longis sparsis raris. Panicula expansa. Valvae dorso parum scabrae. Valvula exterior apice quasi in aristulas denticulata. Processus piliferus brevis. Spiculae 2—3 lin. longae.

## 213. C. VARIA.

Valvae subaequales oblongo-lanceolatae *acutae* glumella parum longiores. Valvulae ext. parum longior interiore, *arista valvulam longe glumam parum saperans; pili exter. glumella breviores, int. glumella fere longiores.*

C. varia *Host gr.* 4. 27. *t.* 47. *Trin. unifl.* 223. *t.* 4. *f.* 9. C. sylvatica *Host gr.* 4. 28. *t.* 48. C. montana *De Cand. fr.* 6. 254. Arundo varia *Schrad. germ.* 1. 216. *t.* 4. *f.* 6. *R. S.* 2. 505. *m.* 2. 286. *W. E. S.* 6. *E. a.* 1. 73. Arundo montana *Gaud. agr.* 91. Arundo Hostii *R. S.* 2. 508. *m.* 2. 281. Hub. in Alpibus Europae et Caucasi. 2. T. Folia scaberrima. Panicula saepe contracta. Valvae dorso scabriusculae. Valvulae apice quasi in aristulas denticulata. Pili sub valvula interiore plerique eidem aequales, sub exteriori pauci multo minores. Processus piliferus sat longus.

## 214. C. CONFINIS.

Valvae subaequales oblongo-lanceolatae *acuminatae* glumella parum longiores. Valvula ext. parum longior interiore, *arista valvulam longe glumam vix superans; pili glumellae subaequales.*

*C. varia confinis* *Trin. unifl.* 224. *Arundo confinis* *W. E.* 127. *R. S.* 2. 507. *m.* 2. 287. Hab. in America boreali. 4. D. Valde affinis praecedenti, nec nisi acumine acutato valvarum diversa.

215. *C. ACUTIFLORA.*

Valvae subaequales lanceolato-lineares *longe acutatae* glumella tertia parte longiores. Valvula ext. interiore tertia parte longior, *arista valvula parum longior; pili glumella fere breviores.*

*C. acutiflora* *De Cand. fr.* 6. 255. *Trin. unifl.* 222. *t.* 4. *f.* 7. *Arundo acutiflora* *Schrad. germ.* 1. 217. *R. S.* 2. 506. *m.* 2. 287. Hab. in Alpibus Europae mediae. 4. D. Folia scaberrima. Panicula expansa et subexpansa. Valvae dorso scabrae. Valvula exterior apice quasi in aristulas denticulata. Processus piliferus brevis.

216. *C. LANGSDORFII.*

Valvae aequales lanceolatae acutatae glumella haud multo longiores. Valvula ext. duplo longior interiore, *arista valvulam vix superans, pili glumella parum breviores, exteriores patentes e calyce emersi.*

*C. Langsdorfii* *Trin. unifl.* 225. *t.* 4. *f.* 10. *Arundo Langsdorfii* *E. a.* 1. 74. *R. S. m.* 2. 287. Hab. in Sibiria, Tobolsk. 4. D. Caulis 4—5 ped. altus. Folia scabra tandem convoluta. Panicula contracta. Valv. 2 lin. et dim. longae scabriusculae. Valvula exterior denticulato-aristulata scabriuscula.

217. *C. SYLVATICA.*

Valvae subaequales oblongo-lanceolatae acutatae glumella parum longiores. Valvula exterior parum longior interiore, *arista glumam paullulum superante; pili*

exter. brevissimi int. paullo longiores, in processu longiores, *glumella breviores*.

*C. sylvatica* Beauv. *Trin. unifl.* 223. *t.* 4. *f.* 8.  
*C. pyramidalis* Host *gr.* 4. 28. *t.* 49. (processu brevi piloso). *C. montana* Host *gr.* 4. 27. *t.* 46. (processu longo piloso). *Arundo sylvatica* Schrad. *germ.* 1. 218. *t.* 14. *f.* 7. *R. S.* 2. 801. *m.* 2. 287. *W. E.* 128. *E. a.* 1. 74. *Arundo montana* *R. S.* 2. 506. (quae *C. montana* Host.) *m.* 2. 287. *Agrostis arundinacea* Linn. *sp. ed.* 2. 91. Hab. in sylvis Europae borealis. 4. D. Folia scabriuscula. Panicula contracta. Valvae scabriusculae. Valvulae denticulato-aristulatae. Processus longissimus.

#### 218. C. STRICTA.

Panicula contracta. Valvae aequales lanceolatae acutae *glumella* vix longiores. Valvula exter. *duplo longior interiore*; arista valvulam vix superante; *pili valvula ext. breviores*.

*C. stricta* Beauv. *Tr. unifl.* 126. *t.* 4. *f.* 12.  
*Arundo stricta* Timm. Schrad. *germ.* 1. 215. *t.* 4. *f.* 5. *W. R.* 87. *E. a.* 1. 74. *R. S.* 2. 504. *m.* 2. 186.  
*Arundo neglecta* Ehrh. *Beitr.* 6. 137. Habitat in paludosis, ad aquas Europae borealis. 4. Folia angusta laeviuscula. Valvae laeviusculae flavescentes 1—2 lin. longae. Processus sat longus.

#### 219. C. TENELLA.

Valvae aequales oblongo-lanceolatae acutae *glumella* sat longiores. Valvula exterior *multo longior interiore*, arista gluma longior; *pili valvula exteriore breviores*.

*Arundo tenella* Schrad. *germ.* 1. 220. *t.* 5. *f.* 1.  
*Agrostis tenella* *R. S.* 2. 346. *m.* 2. 190. Hab. in

Alpibus tyrolensibus. 2. D. Variat corolla mutica. Valvula interior brevissima emarginata. Pili in fasciculis longi stipantibus aequales.

Div. 2. *Arista terminalis et subterminalis aut nulla.*

C. TENELLA. V. supra.

## 220. C. LANCEOLATA.

Valvae subaequales lanceolatae acuminatae *acutissimae* glumella tertia parte longiores. Valv. ext. paullo longior interiore, arista terminali, aut subterminali *tenerrima brevissima* aut nulla; *pili valvis breviores valvula exteriore plerique longiores.*

C. lanceolata *Roth. Trin. unifl.* 218. t. 4. f. 2. C. ramosa *Host gr.* 4. 25. t. 44. C. alpina *Host gr.* 4. 30. t. 51. (mutica.) *Arundo Calamagrostis Schrad. germ.* 1. 214. t. 4. f. 4. *W. E. S.* 6. *E. a.* 1. 74. *Agrostis lanceolata R. S.* 2. 363. *m.* 2. 197. *Agrostis ramosa R. S.* 2. 364. *Agrostis spuria R. S.* 2. 346. (Calam. alpina Host). Hab. in sylvis Europae praesertim borealis, in media et australi alpes adscendit. 2. D. Folia scabra. Panicula saepe expansa. Valvae scabrae. Processus sat longus et fasciculi laterales distincti, pili ext. pauci valvula breviores.

## 221. C. LITTOREA.

Valvae inaequales lineares *longe acutatae* glumella duplo fere longiores. Valvula ext. duplo fere longior, arista terminalis et subterminalis *tenera longiuscula glumam fere superans*, pili longitudine fere *glumae.*

C. littorea *De Cand. Trin. unifl.* 220. t. 4. f. 4. *Arundo littorea Schrad. germ.* 1. 212. t. 4. f. 2. *R. S.* 2. 502. *m.* 2. 285. *W. E.* 126. *E. a.* 1. 73.

*Arundo laxa* *Host* gr. 4. 25. t. 43. *R. S.* 2. 502. *m.* 2. 286. *E. a.* 1. 74. *Arundo glauca* *Marsch.* t. c. 1. 79. 3. 88. *Hornem. hafn.* 1. 14. *R. S.* 2. 503. *m.* 2. 286. *E. a.* 1. 73. *Arundo effusa* *Gmel. bad.* 1. 262. *W. E. S.* 6. Hab. in Europa media et America septentrionali. Folia glauca, scaberrima, tandem saepe convoluta. Panicula maxime effusa. Valvae scabriusculae. Processus medius deficit, laterales fasciculi pilorum adsunt.

---

### 56. AMMOPHILA.

*Gluma* bivalvis, valvae *carinatae* inaequales, *exterior minor*, glumella longiores. *Glumella* bivalvis, exterior sub apice aristata aut aristulata; pili ad basin glumellae. Parapetala germine longiora.

Pili in basi glumellae ut in *Calamagrosti*, cum processu longo pilifero.

### 222. A. ARENARIA.

Folia convoluta. *Panicula subspiciformis*. Valvula exterior sub apice aristulata s. mucronata.

*A. arundinacea* *Host* gr. 4. 24. t. 41. *Psamma arenaria* *Beauv. R. S.* 2. 845. *m.* 2. 464. *Calamagrostis arenaria* *Roth. Trin. unifr.* 227. *Arundo arenaria* *Linn. Schrad. germ.* 1. 221. t. 5. f. 2. *W. E.* 128. *Phalaris ammophila* *E. a.* 1. 66. Hab. ad littora marina arenosa Europae borealis et mediae. 4. D.

### 223. A. BALTICA.

Folia convoluta. *Panicula lobata*. Valvula ext. sub apice aristata.

*Psamma baltica* R. S. 2. 845. *Arundo baltica* Schrad. germ. 1. 225. Hab. ad littora maris baltici. 2. T.

---

Div. (Fam.) VI. CHAETURINAE.

*Panicula* arcta ramis incrassatis brevibus.

---

57. CHAETURUS.

*Gluma*, bivalvis, valva exterior sub apice longe aristata, interior subulata, glumella longiores.

*Glumella* bivalvis, valvulae inaequales, exterior multo major, utraque mutica.

Inter Stipaceas et Festucaceas, praesertim *Vulpiam* intermedius.

224. CH. FASCICULATUS.

Valva exterior dorso scabra, interior laevis, aristata valva longior. Valvulae membranaceae denticulatae laeves.

Ch. fasciculatus *Link* R. S. 2. 324. m. 2. 181. *E. a.* 1. 68. *Polypogon subspicatus* W. E. 88. Hab. in Lusitania, Hispania, Gallia australi, Africa boreali. ☉. T. Gramen caespitosum parvum. Folia angusta brevia, ligula elongata acuta. Spiculae 2 lin. longae, valvae angustae, aristae ad 6 lin. longae.

---

Div. (Fam.) VII. ASPERELLINAE.

*Gluma* nulla.

---

## 58. LEERSIA.

*Gluma* nulla. *Glumella* bivalvis, valvulis carinatis muticis, interiore inclusa. *Styli* plumosi.

Leersiam Swartzius prior vocavit, quam Lamarckius Asprellam. Caulis geniculis hirtis. Ligula brevissima. Panicula explicata. Complicatio valvulae interioris corollae ut in Phalari. Ob valvulam anteriorem et pedicellum ultra nodulum prolongatum glumellam esse puto nec glumam.

## 225. L. ORYZOIDES.

Panicula ramulis patentibus. Valvula extima trinervis nervis et margine hispida.

*L. oryzoides* Swartz *W. E.* 82. *E. a.* 1. 65. *Host gr.* 1. 25. *t.* 57. *Asprella oryzoides* Linn. *R. S.* 2. 266. *m.* 2. 152. *Phalaris oryzoides* Lam. *Schreb. gram.* 2. 6. *t.* 12. Hab. in Europa media, Oriente, America septentrionali et Caribaeis ad aquas. 4. D.

## 226. L. VIRGINICA.

Panicula ramulis adpressis. Valvula extima undique pilis parvis adpressis.

*L. virginica* Gron. *W. E.* 84. *E. a.* 1. 65. *L. oryzoides* Michaux *Pursh. am.* 1. 62. *Asprella virginica* *R. S. m.* 2. 153. Hab. in America boreali. 4. T.

## Div. (Fam.) VIII. HEXANDRAE.

Stam. 6. Parapetala 2.

## 59. ORYZA.

Panicula explicata ramis vaginantibus. Spiculae uniflorae. Gluma bivalvis, valvae subaequales glu-

mella multo minores. Glumella bivalvis, valvulae aequales carinatae, exterior apice interdum aristata. Callus magnus sub glumella. Stam. 6. Styl. 2.

#### 227. O. SATIVA.

Panicula ramis arrectis. Valvae laevissimae carinatae. Valvulae seriatim tuberculatae hirtae.

O. sativa *Linn. W. sp.* 2. 249. *W. E.* 1. 396. *E. a.* 1. 346. Hab. in India. ☉. C. Varietates muticae sunt et aristatae.

### SECTIO IV.

## PANICULATAE MULTIFLORAE.

*Inflorescentia* paniculata aut racemosa, terminalis monoclina. *Spiculae* bi-multiflorae villis non cinctae. Flosculi structura similes.

### SUBORDO I. AVENACEAE.

Gluma major quam pro ratione spiculae pyramidatae. Arista dorsalis aut nulla.

#### 60. AVENA.

*Panicula* effusa. *Spiculae* bi-multiflorae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales. *Glumella* bivalvis, valvula exterior *arista dorsali aut ex emarginatura basi torta articulatim deflexa*, rarius in uno alterove flosculo deficiens. *Parapetala* 2 basi gibba obtusa vel acuta. *Styli* plumosi.

Subgen 1. *GENUINAE*.

*Valvae multinerviae (ultra trinerviae). Spiculae flosculo uno alterove mutico. Pedicelii flosculorum glabri. Germen superne villosum.*

## 228. A. SATIVA.

Panicula effusa. Valvae flosculis longiores acutae. Spiculae bi-triflorae, 2—3 spermae. *Semini*um *glumella crustatum*.

A. sativa Linn. *W. E.* 123. *E. a.* 1. 81. *R. S.* 2. 668. *m.* 2. 370. *Host gr.* 2. 43. *t.* 59. Hab. . . .  
 ☉. D. Arista e nervo exoritur sed nervus laevis tenuior est et epidermis ad duo latera simul emergit, aristae marginem efficit eamque in contorsione involvit. Valvula obtusiuscula subdenticulata basi laevis superne nervis scabra.

Varietates aliae a magnitudine herbae et seminii, uti anglica; aliae a colore glumellae circa seminium, unde A. nigra, rubra (podolica), flava, cinerea, cum in typo speciei sit alba; aut ab aristarum praesentia, aristata, mutica. Flosculus tertius aut deficit, aut neuter adest aut fertilis, unde A. trisperma.

## 229. A. CHINENSIS.

Panicula effusa. Valvae flosculis longiores acutae. Spiculae 4—6 florum, 3—4 spermae. *Semini*um *nudum*.

A. chinensis Metzger. *Cereal.* 53. A. nuda b. chinensis Fischer *R. S.* 2. 669. Hab. . . . ☉. D.

## 230. A. ORIENTALIS.

Panicula coarctata secunda. Valvae flosculis longiores acutae. Spiculae bi-triflorae, rarius 3 spermae. *Semini*um *glumella crustatum*.



vula exter. basi laevis superne nervis scabra *pilis pluribus apice biaristulato-bidentato, pedicelli nudi.*

A. brevis *Roth. W. E. 122. E. a. 1. 81. R. S. 2. 668. Host gr. 3. 29. t. 42. Hab. . . . ☉. D.*

### 234. A. FATUA.

Panicula effusa. Valvae flosculis longiores longe acutatae. Spiculae subtriflorae. Valvula exterior *pilis sparsis basi pilis brevibus stipata apice bidentato.*

A. fatua *Linn. W. E. 123. E. a. 1. 81. R. S. 2. 669. m. 2. 370. Host gr. 2. 42. t. 58. Hab. inter segetes sponte. ☉. D. Pedicellus flosculi secundi hirsutus. Glumella in semine maturo fuscescens.*

### 235. A. STERILIS.

Panicula effusa. Valvae flosculis longiores longe acutatae. Spiculae subtriflorae. Valvula ext. *pilossissima apice nudo producto bidentato.*

A. sterilis *Linn. W. E. 123. E. a. 1. 81. R. S. 2. 670. m. 2. 371. A. fatua Schreb. gr. 1. 109. t. 15. Hab. in Europa australi inter segetes. ☉. D. Germen fasciculis pilorum stipatmu.*

### 236. A. HIRSUTA.

Panicula effusa. Valvae flore longiores longe acutatae. Spiculae subtriflorae. Valvula exter. *pilosa apice nudo producto biaristato.*

A. hirsuta *Roth. R. S. 2. 670. m. 2. 371. Marsch. t. c. 3. p. 83. A. barbata Brot. lus. 1. p. 108. Hab. in Europa australi tam Lusitania quam Tauria, nec non in Caucauso. ☉. D. Nomen A. barbatae olim Pott imposuit, a nobis vero Broteroni traditum est.*

## 237. A. PLANICULMIS.

Caulis *compressus*. *Panicula ramis adpressis*. Valvae flosculis breviores acutae, ext. subtrinervia, inter. subquinenervia. Spiculae 5florae. Valv. ext. *nuda basi pilis brevibus* stipata apice *bifido*.

A. planiculmis *Schrad. W. F. 124. E. a. 1. 81. R. S. 2. 675.* A. latifolia *Host gr. 4. 19. t. 32.* Habitat in Alpibus et Alpestribus Silesiae, Moraviae, Hungariae. 4. D.

## Subgen. 3. STIPACEAE.

*Spiculae flosculis omnibus aristatis. Pedicellus flosculi brevis acutus. Germen glabrum.*

## 238. A. TENUIS.

Folia sicca convoluta. Panicula effusa, ramulis incrassatis. Valvae flosculis breviores multinerviae. Spiculae subtriflorae. Valvula exterior nuda basi pilis brevibus, apice biaristato.

A. tenuis *Moench. Willd. sp. en. 103. E. a. 1. 92. Host gr. 2. 40. t. 55.* A. dubia *Leers. herb. 41. t. 9. f. 3.* Trisetum tenue *R. S. 2. 657. m. 2. 365.* Hab. in Europae mediae collibus siccis. ☉. D. Pedicellus flosculi brevis acutus ut in Stipa et Aristida.

## Subgen. 4. DANTHONIAE.

*Valvula exterior bifida, arista ex emarginatura.*

## 239. A. CALYCINA.

Folia radicalia saepe convoluta, caulina plana, plerumque basi pilosa. Panicula ramis solitariis unifloris. Valvae flosculis longiores enerviae. Spiculae quinqueflorae. Valvula ext. subenervia *laevissima basi et marginibus pilosa.*



*Trisetum pubescens* R. S. 2. 662. m. 2. 366. Hab. in pratis Europae mediae et borealis frequens. 24. D. Germen superne villosum.

## 242. A. PRATENSIS.

*Folia pubescentia radicalia convoluta.* Panicula ramis brevibus solitariis binisve arrectis. Valvae flosculis breviores. Spiculae subquinqueflorae. Valvula ext. subnervia apice biaristulato-denticulata.

A. pratensis Linn. W. E. 124. E. a. 1. 81. R. S. 2. 673. Hab. in Europae mediae et australis pratis. 24. D. Germen superne villosum,

*Var. Subspicata.* A. bromoides Gouan. Linn. E. a. 1. 81. R. S. 2. 674. m. 2. 374. A. pratensis Host gr. 2. 28 t. 51. Hab. in Europa australi. 24. D. Valvulae exterioris apex variat.

## 243. A. FLAVESCENS.

*Folia supra pubescentia.* Panicula effusa ramis brevibus. Valvae flosculis parum breviores. Spiculae subtriflorae. Valvula ext. trinervia, apice biaristata.

A. flavescens Linn. W. E. 124. E. a. 1. 82. Schreb. gr. 1. 76. t. 9. Host gr. 2. 26. t. 38. Trisetum flavescens R. S. 2. 663. m. 2. 368. Hab. in Europae mediae et borealis pratis nec non in Caucaso. 24. D. Germen glabrum.

## 244. A. VERSICOLOR.

*Folia glabra.* Panicula ramis solitariis simplicibus brevibus. Valvae flosculis breviores. Spiculae triflorae. Valvula ext. nervosa apice biaristulato-bifida.



*A. argentea* *W. E.* 1. 125. *A. distichophylla* *Schrad. germ.* 1. 380. *Host gr.* 2. 39. *t.* 53. *Sturm. germ. f.* 26. *Trisetum argenteum* *R. S.* 2. 656. *m.* 2. 368. Hab. in Alpibus Europae mediae. 4. D. Germen glabrum. Valvula ext. subpubescens inter. bifida exteriori subaequalis nervis ciliatis. Folia angustiora ac in praecedente.

248. *A. ALPESTRIS.*

*Folia pilis sparsis. Panicula ramis brevibus coarctatis. Valvae valde inaequales flosculis fere breviores. Spiculae subtriflorae. Valvula ext. nervosa biaristulato-denticulata.*

*A. alpestris* *Schrad. germ.* 1. 379. *Host gr.* 3. 27. *t.* 39. *W. E.* 104. *E. a.* 1. 82. *Trisetum alpestre* *Beauv. R. S.* 2. 665. Hab. in Alpibus Europae mediae. 4. D. Germen subpilosum. Valvula altera sat minor bifida.

Subgen. 6. *ARENELLAE.*

*Valvae aequales et subaequales uninerviae. Valvula exterior interiore sat longior. Germen glabrum.*

✓ 249. *A. CARYOPHYLLEA.*

*Folia convoluta. Panicula effusa. Gluma flosculis longior. Valvula exterior apice bifida laciniis longe acutatis, arista prope basin inserta glumam excedente.*

*Aira caryophylla* *Linn. W. E.* 101. *E. a.* 1. 79. *R. S.* 2. 681. *m.* 2. 377. *Host gr.* 2. 33. *t.* 44. Hab. in Europae borealis arenosis humidis. ☉. D. Folia laevia, ligula longa lacera. Valvae aequales acutae

marginē superne subserrulato-ciliatae. Glumella basi parum pilosa, valvula ext. subtuberculata haud nervosa, arista subito emersa, interior sat minor acutiuscula.

Habemus varietatem flosculo altero aristato, altero mutico, nomine *Airæ capillaris missam*.

### 250. A. PRAECOX.

Folia convoluta. *Panicula contracta*. Gluma flosculis longior. Valvula exterior apice bifida, laciniis longe acutatis, arista prope basin inserta glumam excedente.

*A. praecox Beauv. R. S. 2. 667. m. 2. 370. Aira praecox Linn. W. E. S. 5. E. a. 1. 79. Host gr. 4. 22. t. 37. Habitat in Europae borealis arenosis. ☉. D. Praecedenti valde affinis eadem floris structura.*

### 251. A. SUBSPICATA. L.

Folia pubescentia. *Panicula subspiciformis rachi pubescente*. Gluma flosculis longior. Valvula exterior apice laciniis angustissimis, arista supra medium inserta glumam excedente.

*A. subspicata E. a. 1. 82. A. airoides De Cand. fr. 3. 37. Aira subspicata Linn. Schrad. germ. 1. 264. Host gr. 2. 33. t. 45. Trisetum airoides Beauv. R. S. 2. 666. m. 2. 369. Hab. in Alpibus europaeis frigidioribus. ☉. F. Folia brevia magis minusve pubescentia, ligula biaurita. Spicula bi-triflora; pedicellus tertii floris saltem adest. Valvae subaequales breviter acutae laevissimae margine superne subciliatae. Valvula exterior basi pilis brevissimis, laevissima, interior bifida membranacea.*

## Subgen. 7. KOELERIANAE.

*Valvae valde inaequales uninerviae. Valvula exterior interiore sat longior.*

## 252. A. LOEFLINGIANA.

Folia pubescentia. Panicula ramis solitariis brevibus. Gluma flosculis absque aristis longior. Valvula ext. apice producto terminato in aristas longissimas, arista dorsali vix longiore.

A. loeflingiana Linn. Cavan. ic. 1. 34. t. 45.  
f. 1. Linn. W. Berl. Mag. nat. Fr. 2. 289. t. 8.  
f. 3. Trisetum loeflingianum Beauv. E. S. 2. 661.  
Hab. in campis aridis Estremadurae hispanicae. ☉.  
T. Folia pilis brevibus densis reversis et in vagina.  
Valvula basi parum pilosa pedicello subconico apice producto albo, aristis apicis fuscis.

## 253. A. NEGLECTA.

Folia pilosa vagina inferne glabra. Panicula conglomerata arcta densa. Spiculae triflorae. Valvula exterior apice biaristulata.

A. neglecta Savi pis 1. 132. t. 1. f. 2. E. a. 1.  
82. Trisetum neglectum R. S. 2. 660. m. 2. 365.  
Hab. in uliginosis arenosis Europae australis. ☉. T.  
Valvula basi pilis brevibus.

Avena panicea mea cfr. R. S. 2. 662. huic similima est at valvula exterior apice bifida nec biaristulata. Corollas aristatas dixi ob aristam dorsalem.

## 254. A. CONDENSATA.

Folia pilosa vagina glabra. Panicula subexpansa arcta densa. Spiculae biflorae. Valvula exterior apice subbiaristulata.

*A. condensata Presl E. a. 1. 82. Trisetum condensatum R. S. m. 2. 366. Hab. in Sicilia. ☉. T. Panicula subexpansa a præcedente statim differt. Spiculas semper vidi bifloras.*

*Subgen. 8. AIROIDEAE.*

*Valvae uninerviae. Valvulae subaequales.*

255. *A. FLEXUOSA.*

*Folia convoluta. Gluma flosculis parum brevior. Valvulae obtusae denticulatae, exterior arista prope basin recurva glumam excedente.*

*Aira flexuosa Linn. R. S. 2. 678. m. 2. 376. W. E. 101. E. a. 1. 79. Schreb. gr. 2. 75. t. 30. Host gr. 2. 33. t. 43. Hab. in Europae borealis sylvis arenosis, mediae et australis montibus. 4. D. Panicula effusa. Valvae subaequales acutae dorso superne scabrae. Valvulae subaequales utique nervosae; arista e nervo viridi separata fusca fit et contorta. Rudimentum pedicelli flosculi tertii.*

256. *A. ATROPURPUREA.*

*Folia plana et conduplicata. Gluma flosculis longior. Valvulae obtusae, apice pilosae, ext. supra medium arista incurva glumam haud excedente, int. paullo minor.*

*Aira atropurpurea Wahlenb. R. S. 2. 600. A. alpina Vahl fl. dan. t. 961. Hab. in Lapponia Lulensi. 4. T. Folia brevia, vagina laevi, ligula brevi sublacera. Panicula explicata, ramis simplicibus. Gluma 2—3 lin. longa. Valvae subaequales acutatae. Valvulae arista e carina haud nervosa subito emergens flavescens acutata at obtusa. Pili ad basin longi. Rudimentum pedicelli floris tertii.*

## 257. A. PULCHELLA.

Folia conduplicata. Gluma flosculos aequans. Valvulae obtusae, ext. *supra medium arista recta glumam excedente.*

Aira pulchella *W. E.* 101. *E. a.* 1. 79. *R. S.* 2. 682. *m.* 2. 378. Hab. in Hispania. ☉. T. Habitus Avenae caryophylleae cui primo adpectu simillima. Folia breviter laevia, ligula elongata obtusa. Panicula demum effusa. Gluma vix lin. longa. Valvae aequales obtusae, superne margine subserrulato-ciliatae. Flosculus alter subpedicellatus. Glumella basi parum pilosa. Valvae et valvulae purpurascens apice albae diaphanae, hae tuberculatae nervosae, arista e nervo medio multo crassior nigrescens.

## 61. TRISETUM.

*Panicula* effusa; pedicelli basi incrassati. *Spiculae* 3—4 florum. *Gluma* bivalvis, valva exterior multo minor, interior flosculis fere major. *Glumella* bivalvis, valvula exterior apice biaristulata, sub apice arista inflexa non geniculata. *Styli* plumosi.

## 258. TR. PARVIFLORUM.

Folia pilosa. Panicula ad basin ramorum florifera. Valvula ext. laevis, arista valvula longior.

Tr. parviflorum *Pers. R. S.* 2. 639. *m.* 2. 365. Avena parviflora *Desfont. atl.* 1. 103. Festuca segetum *Savi. pis.* 1. 126. *t.* 1. *f.* 35. Koeleria parviflora *E. a.* 1. 85. Hab. in arenosis Europae australis. ☉. T. Glumella basi callo expresso. Valvula interior

bifida. Planta inter Koeleriam, Avenam et Vulpiam intermedia.

---

## 62. TRICHAETA

*Panicula spiciformis. Spiculae 2—3 florum. Gluma bivalvis, valvae flosculis subaequales apice aristatae. Glumella bivalvis, valvula exterior apice biaristata sub apice arista subarticulato-deflexa. Styli plumosi.*

### 259. TR. OVATA.

Folia breviter hirsuta. Thyrsus subcapinatus. Valvae et valvulae hirtae.

Tr. ovata Beauv. R. S. 2. 633. m. 2. 353. Bromus ovatus Cavan. ic. 6. 67. t. 591. f. 2. Trisetum ovatum Pers. 1. 98. Hab. in Hispaniae et Lusitaniae montosis. ☉. T. Folia ligula brevissima pilosissima. Valva ext. minor angusta trinervis carinata pilosa, interior major trinervis pilosa lateribus membranaceis glabris. Valvula ext. carinata quinquenervia nervis approximatis pilosa lateribus membranaceis glabris triaristata, arista media reflexa longiore et crassiore, inter. apice producta bifida nervis marginalibus nullis.

---

## 63. PSILATHERA.

*Panicula capitata. Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis, valvae subaequales truncatae ciliatolacerae, arista e medio. Glumella bivalvis, valvula exterior aristis 5, interior aristis 2. Styli pilosi.*

## 260. PS. TENELLA.

Folia radicalia angustissima, caulina breviter latiuscula. Panícula subglobosa.

*Sesleria tenella* Host gr. 2. 71. t. 100. R. S. 2. 604. m. 2. 337. E. a. 1. 84. *Sesleria microcephala* Pers. syn. 1. 72. *Cynosurus microcephalus* Hoffm. germ. 2. 49. *Cynosurus ovatus* Hoppe Sturm. germ. f. 6. Hab. in Alpibus Noricis. 24. D. F. Flores coeulescentes.

## 64. CAMPELLA.

*Spiculae* biflorae, interdum 3—5 florum, flores superiores pedicellati. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales flosculo inferiore parum breviores aut longiores. Pedicelli pilosi, pili glumellam stipantes. *Glumella* bivalvis, valvulae aequales et subaequales, ext. arista prope basin aut in dorso recta; interior non inclusa. *Pedicellus* longe comosus ad dorsum valvulae interioris. *Parapetala* lanceolata. *Styli* subpenicillares.

## 261. C. CAESPITOSA.

Folia radicalia convoluta, caulina sulcata scaberrima. Arista prope basin.

*Deschampia caespitosa* Beauv. R. S. 685. m. 2. 397. *Aira caespitosa* Linn. W. E. 100. E. a. 1. 78. Host gr. 2. 31. t. 42. Habitat frequens in Europa boreali et media, ad vias, aggeres. 24. D. Valvae laeves acutae, exterior flosculo infimo parum brevior. Valvula exterior dorso basi pilosa; arista valvulam vix superans.

*Var. Brevifolia* a typo speciei differre videtur.





*lus.* 1. 108. Hab. in Lusitaniae siccis. 2. T. Caulis non bulbosus. Folia longissima saepe omnia vagina pubescente, pilis brevibus divaricatis. Flores pallidi. Valvula exterior pilosa; arista hermaphroditi brevissima aut nulla.

---

### 67. HOLCUS.

*Panicula* effusa. *Spicula* biflora, *flosculo inferiore mutico hermaphrodito, superiore aristato masculo.* *Gluma* bivalvis, valvae subaequales flosculis sat longiores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior mutica aut sub apice aristata, arista non articulato-deflexa. *Styli* plumosi.

#### 267. H. LANATUS.

Stolones nulli. Folia tota tomentoso-pubescentia. *Arista gluma inclusa.*

H. lanatus Linn. *W. E.* 1034. *E. a.* 1. 80. *R. S.* 2. 055. *m.* 2. 363. *Schreb. gram.* 1. 149. *t.* 20. *f.* 21. *Host gr.* 1. 2. *t.* 2. Hab. in totius Europae pratis arenosis. 2. D. Valva exterior angustior brevior uninnervia, interior trinervia multo latior. Arista flexa apice recurva.

#### 268. H. MOLLIS.

Stolones repentes. Folia vagina inferne glabra scabra. *Arista glumam excedens.*

H. mollis Linn. *W. E.* 1034. *E. a.* 1. *R. S.* 2. 655. *m.* 2. 363. *Schreb. gram.* 1. 149. *t.* 20. *f.* 2. *Host gr.* 1. 2. *t.* 3. Hab. ad aquas per totam Europam. 2. D. Flos ut in praecedente, arista flexa apice rectiusculo.

---

## 68. HIEROCHLOA.

*Panicula* explicata. Spiculae triflorae, *flosculi inferiores masculi, intermedius hermaphroditus* *Gluma* bivalvis, valvae subaequales, flosculis longiores. *Glumella* mascula bivalvis, valvula interior aristata mucronata aut mutica, exterior implexa. *Glumella* hermaphroditi similis. Color valvarum valvularum, et pilorum fuscus.

## 269. H. BOREALIS.

Caulis stolonifer. Pedicelli glabri. Valvula exterior masculorum *ex apice mucronata* hirta ciliata.

H. borealis *R. S.* 2. 513. *m.* 2. 291. *E. a.* 1. 80. *Holcus borealis* *Schrad. germ.* 1. 252. *W. E.* 1035. *Sturm. fl.* 40. *Holcus odoratus* *Linn. W. sp.* 4. 435. *Holcus repens* *Host gr.* 3. 3. *t.* 3. Hab. ad aquas in Europa boreali. 2. D.

## 270. H. AUSTRALIS.

Caulis stolonifer. Pedicelli superne hirti. Valvula exterior *maris infimi supra medium aristata, maris superioris infra medium aristata*, arista geniculata *glumam excedente*, hermaphroditi sub apice mucronata, omnes glabriusculae ciliatae.

H. australis *R. S.* 2. 514. *m.* 2. 292. *E. a.* 1. 80. *Holcus australis* *Schrad. germ.* 1. 253. *Holcus odoratus* *Host gr.* 4. 4. *t.* 4. *Sturm. germ.* 44. *Holcus repens* *W. E.* 1034. *sec. herb.* Hab. in Europa media. 2. D.

## 69. AIRQCHLOA.

*Panicula* arrecta. Spiculae compressae, bi-triflorae. *Gluma* bivalvis. *Glumella* bivalvis, val-

*vula exterior mutica aut apice mucronata aut sub apice aristata, arista recta a carina haud distincta. Callus sub glumella. Parapetala plerumque bidentata. Styli subpenicillares.*

Genus medium, species inter Koeleriam, Poam, Airam, Avenam, Phalaridem, Dactylin et Festucam intermedias complectens.

### 271. A. CRISTATA.

Folia hirta ciliata glabrave. Panicula ramulis brevibus remotiusculis. Valvae flosculis parum breviores acutatae carina exasperatae. Valvula exterior saepe ex apice mucronata carina exasperata.

*Var. 1. Hirta.* Koeleria cristata Pers. R. S. 2. 619. m. 2. 343. E. a. 1. 33. Aira aristata Linn. sp. W. E. 100. Poa cristata Linn. syst. Willd. sp. Host gr. 2. 54. t. 75. Hab. in Europae mediae siccioribus. 4. D.

*Var. 2. Glabra.* Koeleria glauca De Cand. R. S. 2. 621. m. 2. 345. Aira glauca Schrad. W. E. 100. Hab. in Europae mediae sabulosis. 4. D. Caulis superne pubescens glaberve. Ligula in hac et sequentibus brevissima.

### 272. A. VALLESIACA.

Caulis basi tuberascens. Folia radicalia convoluta, caulina plana. Panicula ramulis brevibus approximatis. Valvae flosculis parum breviores acutatae. Valvula exterior apice mucronata, haec et valvae dorso exasperatae saepeque superne ciliatae, lateribus brevissime pilosis.

Koeleria vallesiaca *De Cand. R. S. 2. 622. m. 2. 346.* K. tuberosa *Pers. E. a. 1. 83.* K. setacea *De Cand. R. S. 2. 622. m. 2. 346.* Aira vallesiaca *Allion. auct. 40.* Habitat in Valesia et in montosis Europae australis. 24. D. An revera a praecedente diversa?

## 273. A. VILLOSA.

Folia hirsuta. *Panicula spiciformis.* Spicula *uniflora pedicello secundi floris aut biflora.* Valvae valvulis parum longiores acutae. Valvula exterior *sub apice arista minuta*, haec et valvae carina longe ciliatae lateribus pilosiusculis.

Koeleria villosa *De Cand. R. S. 2. 623. m. 2. 347. E. a. 1. 85.* Aira pubescens *W. sp. 1. 377. E. S. 5.* Phalaris pubescens *Lam. De Cand. fr. 3. 8.* Hab. in Gallia australi. ☉. T. Inter Koeleriam et Phalarideas intermedia.

## 274. A. ALBESCENS.

Caulis pubescens. Folia *convoluta* pubescentia. *Panicula spiciformis cylindrica.* Spiculae biflorae. Valvae flosculis parum breviores acutae. Valvula exterior acuta *submucronata*, haec et valvae pilosae.

Koeleria albescens *De Cand. R. S. 2. 621.* Hab. in Gallia australi et Hispania. 24. T. Habemus nomine Aira aristatae ex Hispania. Var. glabra specie differre videtur.

## 275. A. PUBESCENS.

Caulis superne pubescens. Folia *plana* pubescentia. *Panicula spiciformis subinterrupta.* Spiculae subtriflorae. Valvae flosculis parum longiores. Valvula

Valvula exterior sub apice obtusiusculo membranaceo arista *valvas parum superante*; uti valvae *carina longe ciliata lateribus pilosis*.

Hab. in Gallia australi. 2. T. Vix pedem alta. Folia lin. lata non convoluta. Panicula tenuis ut in praecedente et tenuior ac in K. vallesiaca, basi vix interrupta. Valvae acutae. Valvula exterior sub apice aristula evidente, majore ac A. in vallesiaca, minori ac in sequente.

### 276. A. HIRSUTA.

Caulis superne hirsutus. Folia *conduplicata* breviter angusta. Panicula *spiciformis oblonga*. Spiculae biflorae. Valvae flosculis parum breviores acutiusculae. Valvulae sub apice acutato *arista longiuscula*, uti valvae *aristae ciliatae lateribus pilosis*.

Koeleria hirsuta *De Cand. R. S. 2. 622.* Aira hirsuta *Hall. fil. Schleich.* Festuca hirsuta *De Cand. fr. 3. 53.* Hab. in Vallesiae pascuis Alpium editiorum ad Rhodani fontes. 2. F. Valvae et valvulae exteriores violaceae. Habitus Avenae subspicatae.

A. HISPIDA. v. Koeleriam hispidam.

## 70. AIRA.

*Spiculae* bi-triflorae, flosculo tertio masculino. *Gluma* bivalvis, valvae *aequales* longitudine flosculorum aut longiores brevioresque. *Glumella* bivalvis, valvulae aequales et inaequales *muticae*. *Parapetala* lanceolata acuta. *Styli* plumosi.







strali. 24. D. Valvae subaequales obtusae flosculos subaequantes. Valvula exterior obtusa multinervia.

## 286. M. MINUTA.

Folia *convoluta tenuissima* scabra, ligula mediocri lacera. Panicula *ramis paucis adpressis*. Spiculae *biflorae* subnutantes breviter pedicellatae.

M. minuta Linn. R. S. 2. 524. m. 2. 295. M. aspera Vivian. Annal. bot. 1. 2. 138. M. nutans Cavan. ic. 2. 58. t. 175. f. 2. M. ramosa Loisel. gall. 1. 47. M. saxatilis Sibthorp. gr. 1. 53. t. 71. Hab. in Europa australi. 24. T. Valde affinis praecedenti ut varietatem humiliorem credas. Floris constructio eadem.

## 287. M. ALTISSIMA.

Folia *latissima* scaberrima, ligula longiuscula lacera. Panicula *ramis simplicibus brevissimis adpressis*. Spiculae *biflorae* subnutantes breviter pedicellatae. Valvula exter. acuta multo major interiore, margine inferne scabra.

M. altissima Linn. W. E. 10. E. a. 1. 179. R. S. 2. 528. Hab. in Europa orientali, Caucaso. 24. D. Valvae subaequales obtusae flosculos subaequantes.

## 72. SCHISMUS.

*Panicula simplex* arcta ramulis incrassatis. Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis valvae subaequales *valvulis inferioribus multo majores* medio nervosae. Glumella bivalvis, valvula exterior multinervia *mutica*; callus non separatus.

## 288. SCH. MARGINATUS.

Folia lamina laevi pilosa. Valvae lanceolatae acutae medio nervosae lateribus membranaceis. Valvula exterior sursum dilatata pilis sparsis longis apice membranaceo emarginato; interior aequalis obtusa.

Sch: marginatus *Beauv. R. S. 2. 584. m. 2. 325. E. a. 1. 89.* Festuca calycina *Linn. Cavan. ic. 1. 33. t. 44. f. 2. Willd. sp. 1. 427.* Hab. in Gallia australi, Hispania. ☉. D.

---

## 73. TRIODIA.

*Panicula subracemosa. Spiculae 3—5 florum.*

*Gluma bivalvis flosculis aequalis, valvae inaequales, exterior major. Glumella bivalvis mutica basi fasciculis 2 pilorum. Seminium tridentatum, dentibus lateralibus styliferis.*

## 289. TR. DECUMBENS.

Folia vagina laevi, ad oras pilosa, ligula brevissima truncata pilosa. Spiculae teretiusculae. Valvae longe acutatae laeves, valvula ext. tridentata laevis basi ciliata.

Tr. decumbens *Beauv. R. S. 2. 597. m. 2. 333. E. a. 1. 89.* Poa decumbens *Schrad. Host gr. 2. 52. t. 72.* Festuca decumbens *Linn. Willd. sp. 1. 424.* Hab. in Europae mediae et australis sylvis siccis. 4. D.

---

## 74. PHRAGMITES.

*Panicula explicata. Spiculae multiflorae, flosculus infimus masculus nudus, superiores herm-*

*aphroditi pilis e rachi stipati. Gluma* bivalvis, valva exterior minor, interior flosculis subaequalis. *Glumella* bivalvis, valvulae inaequales. *Styli* subpenicillares.

## 290. PHR. COMMUNIS.

Valva ext. duplo minor, utraque lanceolata acutiuscula. Valvula ext. longissime acutata glabra, interior duplo brevior truncata.

Phr. communis *Trin. agr. Mertens et Koch germ.* 1. 527. *Arundo Phragmites Linn. W. E.* 126. *E. a.* 1. 74. *R. S.* 2. 510. *m.* 2. 289. *Schrad. germ.* 1. 223. *t.* 5. *f.* 4. *Host gr.* 4. 23. *t.* 39. Hab. in fossis Europae borealis et mediae. 4. D.

## 75. ARUNDO.

*Panicula* explicata. *Spiculae* multiflorae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales flosculis fere longiores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior sub apice aristata. *Pili e basi glumellae ipsam aequantes. Styli* 2 penicilliformes.

## 291. A. DONAX.

*Panicula* effusa. *Spiculae* subquinqueflorae. Valvae subaequales longe acutatae. Valvula exter. basi pilosa, apice demum bifido dentibus longe acutatis, arista sub bifurcatione brevi; inter. fere duplo brevior truncato-denticulata.

*A. Donax Linn. W. E.* 126. *E. a.* 1. 79. *Host gr.* 4. 22. *t.* 38. *Donax arundinaceus Beauv. R. S.* 2. 600. *m.* 3. 334. *Scolochloa arundinacea Mert. et Koch germ.* 1. 508. Hab. in Europa australi. 4. T.

*Arundo mauritanica* differt valvula exterior non bifida, arista sub apice acuto et fere ex apice brevi.

---

## 76. AMPELODESMOS.

*Panicula* explicata. *Spiculae* multiflorae compressae. *Gluma* bivalvis, valvulae inaequales, exterior minor, glumella breviores, valvulis minus nervosae. *Glumella* bivalvis, valvula exterior ex apice longe acutata fere aristata. *Pili e pedicello glumellae ipsam cingentes*. *Parapetala* 2 lanceolata superne fimbriata. *Germen* apice hirsutum.

## 292. A. TENAX.

Folia convoluta rigida. *Panicula* elongata, ramis brevibus. *Spiculae* quadriflorae. Valva exterior uninnervia acutata, interior trinervia longe acutata. Pili medias valvulas attingentes. Valvula ext. quinque-nervia acutata mucronata, interior bidentata.

*Arundo tenax* *Vahl symb.* 2. 25. *W. sp.* 1. 455. *Arundo mauritanica* *Poiret voy.* 2. 105. *Arundo festucoides* *Desfont. atl.* 1. 100. t. 34. *Ar. ampelodesmos* *Cynill. neap. f.* 2. t. 12. *Donax tenax* *Beauv. R. S.* 2. 601. m. 2. 335. Hab. in Europa australiori et Africa boreali. 4. T.

---

## 77. SCOLOCHLOA.

*Panicula* explicata. *Spiculae* multiflorae teretiusculae. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales, exterior flosculis subaequalis; interior longior. *Glumella* bivalvis, valvula exterior mutica. *Pili in*

*fasciculis 2 callo impositis. Parapetala 2 lanceolata acuta.*

### 293. SC. FESTUCACEA.

*Panicula effusa. Spiculae quadriflorae. Valva exterior uninervia, interior subtrinervia longe acutata. Valvula exterior nervosa apice sublacero. Pili mediam valvulam non attingentes.*

*Arundo festucacea W. E. 1. 126. E. a. 1. 175.*

*Donax festucaceus Beauv. R. S. 2. 602. m. 2. 353.*

*Hab. in Germania boreali et Suecia in fossis. 4. D.*

### Subordo III. FESTUCACEAE.

*Panicula rachi excisa aut racemosa articulata. Spiculae pyramidatae gluma conveniente aut minore. Excisura simplex aut rarius duplex.*

### 78. FESTUCA.

*Panicula explicata. Spiculae multiflorae sub flosculis articulatim discedentes. Gluma bivalvis, valvae inaequales aut subaequales acutae. Glumella bivalvis, basi callo separato, valvula ext. apice aut parum sub apice aristata aut mucronata rarius mutica. Parapetala 2 bidentata in plurimis; rarius denticulata aut integra. Styli plumosi.*

#### *Subgen. 1. GENUINAE.*

*Panicula explicata.*

### 294. F. TENUIFOLIA.

*Folia brevia filiformia scabriuscula. Panicula ramis arrectis. Spiculae 5—7 florum. Valva exte-*



caulina canaliculata. Spiculae 4 lin. longae. Hostii icon optima.

*Var. 2. Hirsuta.* Folia hirta, spiculae hirtae. *St. Amand*

F. hirsuta *Host gr. 2. 61. t. 85.* F. ovina  $\beta$ . *Schrad. l. c.* F. intermedia *R. S. l. c.* Hab. in pascuis arenosis Europae mediae et borealis. 4. D. Spiculae 4. lin. longae.

### 296. F. PALLENS.

*Herba glaucescens.* Folia brevica filiformia scabra et scabro-pubescentia. Panicula ramis arrectis. Spiculae 5florae. Valva exterior minor uninervia, interior trinervia, utraque longe acutata. Valvula exterior enervia longiuscule aristata.

F. pallens *Host gr. 2. 63. t. 88. Schrad. Mert. et Koch germ. 1. 649.* Hab. Europa boreali et media, copiosissima circa Berolinum. 4. D. Spiculae 3 lin. longae. Valvula interior superne nervis scabro-ciliatis.

### 297. F. GLAUCA.

*Herba glauca.* Folia longiuscula filiformia scabra aut pubescentia rigida. Panicula ramis floriferis patentibus. Spiculae 6—7 florae. Valva exterior minor uninervia, interior trinervia, utraque acuta. Valvula exterior enervia breviaristata mucronata. F. glauca *Lam. Enc. 2. 459. ill. t. 46. f. 3. R. S. 2. 720. m. 2. 394.* Hab. in montibus Europae mediae, in Germania australi. 4. D. Major praecedente, sed aristae multo minores. Spiculae 4 lin. longae. F. cinerea *Vill. delph. 2. 98.* habet folia brevica crassa, valvulas exteriores superne subpubescentes.

## 298. F. ALPINA.

Folia *longiuscula filiformia laxa*. Panicula *racemosa brevis*. Spiculae 5florae. Valva exterior uninervia, interior subtrinervia, utraque longe acutata. Valvula exterior enervia *arista longiuscula*.

F. alpina *Gaudin De Cand. fr. 6. 266. R. S. 2. 718. Mert. et Koch germ. 1. 644.* Hab. in Alpibus, Austriae, Helvetiae, Delphinatus. 24. D. Spiculae 3 lin. longae.

## 299. F. VAGINATA.

Folia *filiformia longa laevia*. Panicula *ramis patentissimis*. Spiculae 7florae. Valva exterior uninervia duplo minor, interior trinervia utraque acuta. Valvula exterior enervia *mucronata*.

F. vaginata *W. E. 116. E. a. 1. 91.* (lapsu calami aristae longiores dictae cum breviores sint) *Schult. oesterreich. Fl. ed. 2. 242. R. S. 2. 725. m. 2. 398.* Hab. in Hungariae arenosis. 24. D. Spiculae 4—5 lin. longae.

## 300. F. AMETHYSTINA.

Folia *filiformia longiuscula laevia*. Panicula *ramis patentibus*. Spiculae 4—5florae. Valva exterior uninervia minor, interior trinervia, utraque acuta. Valvula exterior enervia *mucronata*.

F. amethystina *Linn. W. E. 114. E. a. 1. 91. R. S. 2. 718. m. 2. 394. Host gr. 2. 63. t. 89.* Hab. in collibus siccis Germaniae australis. 24. D. Spiculae vix 3 lin. longae, quibus dignoscitur, cum caulis saepe 1—2 ped. altus sit. Vaginae foliorum radicalium saltem rubescunt.



diae. 24. F. Spiculae violaceo flavoque variae. *Seminia hirta superne.*

### 304. F. RUBRA.

*Caulis stoloniferus. Folia radicalia filiformia, caulina plana. Panicula ramis floriferis patentibus. Spiculae 5—6 florum. Valva exterior duplo minor uninervia, interior subtrinervia, utraque lanceolata. Valvula exterior enervia, breviaristata.*

*F. rubra Linn. W. E. 115. E. a. 1. 92. R. S. 2. 724. m. 2. 398. Host gr. 2. 59. t. 81. Hab. in arenosis totius Europae. 24. D. Ligula brevis. Spiculae glabrae, scabrae, hirtae, uti et folia. F. rubra? Regensb. bot. Ges. Schrift. 1. 59. videtur varietas F. rubrae.*

### 305. F. FENAS.

*Folia plana. Panicula elongata ramis brevibus arrectis ad basin floriferis. Spiculae 7—8 florum. Valva exterior duplo minor uninervia, interior trinervia, utraque obtusa. Valvula exterior subenervia acuta.*

*F. fenas Lagasc. R. S. 2. 713. m. 2. 391. Poa tenax E. a. 1. 87. Hab. in Hispania, Lusitania. 24. D. Caulis tenax. Spiculae ad 6 lin. longae. Valvula exterior limbo violaceo flavoque, interior subaequalis acutiuscula.*

### 306. F. SPADICEA.

*Folia plana. Panicula ramis patentibus. Spiculae 5 florum. Valvae subaequales uninerviae late lanceolatae acutiusculae. Valvula exterior subquinquenervia acutiuscula submucronata, interior non plane inclusa colorata truncata.*















## 326. SCL. RIGIDA.

*Panicula ramulis solitariis, pedunculis subfasciculatis, pedicellis brevissimis et basi articulatis.* Spiculae cylindricae. Valvae obtusae, ext. uninervia, interior trinervia. Valvulae obtusissimae rarius mucronulatae nervis obsoletis.

Scl. rigida *Panzer. E. a. 1. 90.* *Poa rigida Linn. W. E. 107. Host gr. 2. 53. t. 74.* *Megastachya rigida R. S. 2. 391. m. 2. 397.* Hab. in Europae mediae et australis locis siccis. ☉. T. Spiculae 8 lin. longae. Haec species est typus generis.

## 327. SCL. ARTICULATA.

*Panicula ramulis solitariis dichotomis, pedicellis brevissimis et basi articulatis, rachi ad nodos constrictae articulatae.* Spiculae cylindricae. Valvae et valvulae exteriores acutiusculae, hae subinde mucronulatae.

Scl. articulata *E. a. 1. 90.* *Festuca divaricata Desfont. atl. 1. 89. t. 22. W. E. 118.* *Schoenodorus divaricatus R. S. 2. 753. m. 2. 390.* Hab. in Europae australis et Africae borealis maritimis. ☉. T. Spicula 8 lin. et ultra longa.

## 328. SCL. DICHOTOMA.

*Panicula ramulis solitariis dichotomis, pedicellis brevissimis et basi articulatis; rachi non articulatae.* Spiculae cylindricae. Valvae acutae, exterior uninervia, interior trinervia. Valvulae exteriores acutae mucronatae tricarinatae.

Scl. dichotoma *E. a. 1. 90.* *Festuca dichotoma W. E. S. 6.* *Triticum maritimum Linn. W. sp. 1. 481.* *Brachypodium maritimum R. S. 2. 743. m. 2.*

406. Hab. in Angliae et Galliae nec non Africae borealis maritimis. ☉. T.

## 329. SCL. DIVARICATA.

Panícula ramulis subfasciculatis dichotomis, pedicellis longiusculis incrassatis, basi non articulatis. Valvae flosculis inferioribus multo breviores obtusae altera alteram non amplexante. Valvulae exteriores obtusissimae.

Scl. divaricata Beauv. R. S. 2. 697. m. 52. 388. E. a. 1. 89. Poa divaricata Gouan. ill. 4. t. 2. f. 1. Hab. in Europa australi humidis. ☉. T.

## 81. ARTHROSTACHYA.

*Spica ramosa articulata. Spiculae* multiflorae. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales, interior spicae subaequalis. *Glumella* bivalvis, valva exterior sub apice aristata. *Parapetala* 2 bifida acutata. *Styli* pilosi.

Spica ita constructa est, ut racheos continuatio supra spiculam pedicellum sistat teneriorem.

## 330. A. COARCTATA.

Caulis ramosissimus. Folia dense pilosa. Valva exterior trinervia, interior multinervia, utraque acuta pilosa. Valvula ext. lanceolata minus nervosa pilosa, arista valvulae aequalis; interior duplo brevior truncata pilosiuscula.

Bromus coarctatus Hornem. hort. hafn. Hab. . . . ☉. D. Caulis adscendens geniculatus. Herba pilosa. Folia ligula rotundata margine lacera summum spi-









*C. unioloides* Beauv. *R. S.* 2. 596. *m.* 2. 352. *E. a.* 1. 85. *Festuca unioloides* *W. E.* 115. *Hort. ber.* 1. p. 3. t. 3. Hab. in America boreali. ☉. D. Folia 2—3 lin. lata. Spiculae 8—10 florum fere poll. longae 3 lin. latae saepe pilis sparsis.

---

## 85. LIBERTIA.

*Panicula expansa.* Spiculae multiflorae compressae. Gluma bivalvis, valvula ext. apice aristis binis sub apice arista longiore, margine explanato inferne auricula utrinque unica, interior paullo minor bidentata. Parapetala oblongo-lanceolata acuta magna. Styli plumosi.

Paniculae rachis incisuris binis.

## 341. L. ARDUENNENSIS.

Folia superne pilosa, ligula lacera. Panicula ramis arrectis subsimplicibus. Arista valvula brevior.

*L. arduennensis* Lejeune *Act. Acad. Leopoldino-Carol. T.* 12. *P.* 1. p. 753. t. 65. Hab. inter segetes circa Acivaille in Provincia Leodiensi. 4. D. Habitus *Ceratochloae*.

---

## 86. CALOTHECA.

*Panicula racemosa.* Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis, valvae aequales flosculis inferioribus sat breviores. Glumella bivalvis, basi callo nullo, valvula exterior margine explanato e carina aristulata, interior multo minor, seminium late amplexans. Parapetala 0. Styli plumosi.

## 342. C. DILATATA.

Folia ligula elongata, lamina demum convoluta. Valvula exterior dilatata medio acutata, arista brevi sub apice bifido.

Hab. in Montevideo (Sello). 2 $\frac{1}{2}$ . T.

Caulis erectus. Folia vagina laevi, ligula longa, lamina angusta infra laevi, supra striata scaberrima. Panicula ramis binis, altero brevi, altero longiore. Spiculae crassae 4 lin. longae et latae ovatae basi fere attenuatae. Valvae ovatae obtusiusculae margine angusto membranaceo medio trinerves. Valvula exterior maxima dilatata marginibus membranaceis, antice in acumen angustum bifidum membranaceum terminata, medio inferne nervosa, arista brevi sub apice hunc parum superante; interior multo minor ovata obtusa margine lato germen amplexans. Parapetala 2 lanceolata obtusa brevissima. Differt a C. brizoides R. S. 2. 632. Beauv. agr. t. 17. f. 6. (Bromo brizoides Herb. Willd.) spiculis duplo majoribus, caeterum maxime affinis. Characteres generum Calotherae et Chascolytri in Roem. Schult. syst. 2. 38. transpositae videntur.

## 87. UNIOLA.

*Panicula racemosa. Spiculae compressae multiflorae, flosculo infimo abortiente univalvi. Gluma bivalvis, valvae inaequales. Glumella bivalvis, basi callo nullo, pilis cincta e rachi oriundis, valvulae muticae margine basi explanato.*

## 343. U. LATIFOLIA.

Folia ligula vix ulla, lamina basi supra pilosa. Valvula exterior multinervia falcata, carina inferne ciliata superne scabra.

U. latifolia *Michaux W. E. 110. E. a. 1. 84 R. S. 2. 594. m. 2. 331.* Hab. in montibus Alleghanis (Pursh). 4. T. Folia lamina 5 lin. lata. Spiculae 8florae 6 lin. longae 4 lin. latae. Valvae valvulis angustiores. Valvula exterior 6 lin. longa acutiuscula, interior basi ex exteriore prominente apice bifido.

## 88. DIARRHENA.

*Panicula* expansa. *Spiculae compressae* multiflorae, flosculis subdistantibus. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales. *Glumella* bivalvis, basi callo expresso, valvula ext. medio explanata dilatata apice subulato, includens interiorem. *Stam* 2. *Styli* plumosi. *Parapetala* 2 lanceolata acuta.

## 344. D. AMERICANA.

Folia ligula brevi truncata. *Panicula* elongata ramis adpressis. Valvula exterior superne trinervia.

D. americana *Beauv. R. S. 2. 289. m. 2. 231.* Festuca diandra *Michaux. am. 1. 67. t. 10. W. E. 116. E. a. 1. 91.* Corycarpus arundinacens *Zea Lagasc. gen. et sp. 4. nr. 47.* Roemeria *Zea R. S. 1. 287.* Hab. in sylvis antiquis provinciae Kentucky, Tennessee. 4. D. Caulis sursum scaber. Fol. 6 lin. lata. Spiculae 4—6 florae 7—8 lin. longae, flosculi patentes. Valva ext. uninervia, interior trinervia. Valvulae laevissimae, nervis viridibus.

## CHASMANTHIUM.

*Panicula expansa. Spiculae compressae* multiflorae, flosculis subdistantibus. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales. *Glumella* bivalvis, basi callo vix ullo, valva ext. angusta falcata, interior brevior *dilatata exclusa. Stam. 3. Styli* plumosi. Genus affine Diarrhenae.

## CH. GRACILE.

Folia ligula vix ulla. Panicula elongata, ramis arrectis simplicibus.

Uniola gracilis *Michaux R. S. 2. 595. m. 2. 333. Pursh. am. 1. 82. Holcus laxus Willd. sp. 4. 934.* Hab. in rupestribus a Virginia ad Georgiam. 24. T. Folia lamina longa 3 lin. lata. Spiculae 4 florum 3 lin. longae 2 lin. fere latae. Valvula interior e fusco virens.

## 89. BRIZOPYRUM.

*Panicula arctissima, superne saepe spica. Spiculae compressae. Gluma* bivalvis, valvae inaequales; exterior minor. *Glumella* bivalvis, basi callo parvo, valvula exterior mutica includens alteram. *Styli* plumosi.

## 345. BR. SICULUM.

Folia plana ligula brevi truncata. Panicula superne spica. Spiculae 15—25 florum. Valvula exterior basi subpilosa. Poa sicula *Jacq. R. S. 2. 569. m. 2. 316. Triticum unioides Ait. W. E. 130. Brachypodium unioides E. a. 1. 95.* Hab. in Europa australi, Africa boreali. ☉. T. Parapetala oblique truncata, hinc longe acutata.



strali et Africa boreali. ☉. T. Intermedia inter Koeleriam et Airochloam.

## 347. K. PHLEOIDES.

Folia saepe pilosa. Panicula *spiciformis subinterrupta*. Spiculae 4—5 florum. Valvae acutae. Valvula exterior nervosa pilosa scabrave *sub apice arista longiuscula*.

K. phleoides Pers. *De Cand. R. S.* 2. 624. m. 2. 347. *E. a.* 1. 83. Festuca cristata Linn. *W. E.* 117. Festuca phleoides Allion. Vill. Desfont. *Host gr.* 3. 15. t. 21. Bromus trivialis Savi *pis.* 1. 124. Hab. in Europae australis graminosis. ☉. T. Hirsuties valde variat.

## 348. K. BRACHYSTACHYS.

Folia *lata pilosa*. Panicula *spiciformis interrupta*. Spiculae 4—5 florum. Valvae acutae. Valvula exterior nervosa scabriuscula *sub apice arista longiuscula*.

K. brachystachys *De Cand. R. S.* 2. 625. m. 2. 348. *E. a.* 1. 83. Hab. . . . ☉. T. Vix nisi panicula magis interrupta a praecedente differt. Constat tamen permanet. Fol. 3 lin. lata.

## 349. K. LAXA.

Folia *angusta glabra ciliata*. Panicula *spiciformis interrupta*. Valvae longe acutatae. Valvula exterior nervosa laevis *sub apice arista longiuscula*.

Hab. in Aegypto. Ehrenberg. ☉. T. Praecedenti proxima at folia angustiora lin. lata, panicula tenuis, spiculis multo minus densis.







Hab. in Europa australi, Africa boreali. *Spiculae cum aristis ultra 3 poll. longae.*

## 358. BR. STERILIS.

*Folia pubescentia. Panicula effusa, spiculae 8—10 florum, flosculi patentes. Valvae longe acutatae. Valvula ext. nervosa longe acutata piloso-scabra, arista valvula longior.*

Br. sterilis *Linn. W. sp. 1. 433. W. E. 120. E. a. 1. 93. R. S. 2. 647. m. 2. 339. Host gr. 1. 13. t. 16.* Hab. in Europa praesertim boreali ad vias  
 ☉. D.

## 359. BR. LONGIFLORUS.

*Folia vagina superne ciliata, lamina supra pilosa. Panicula ramis elongatis unifloris pendulis, spiculae 6 florum, flosculi patentissimi. Valvae longe acutatae, arista valvula longior.*

Br. longiflorus *W. E. S. 6. Spreng. pugill. 2. 23. R. S. 2. 645.* Hab. . . . 4. D. Valde affinis Br. sterili. Differt panicula magis ampla foliorumque pubescentia.

## 360. BR. CATHARTICUS.

*Folia vagina pilosa superne pilis confertis, lamina glabra. Panicula ramis subsimplicibus et simplicibus patulis, spiculae 6 florum, flosculi patentes. Valvae acutatae. Valvula ext. superne nervosa piloso-scabra, arista valvula brevior.*

Br. catharticus *Vahl. en. 2. 22. W. sp. 1. 431. R. S. 2. 642.* Hab. in Peruvia. 4. D. Vahl's descriptio nimis brevis, sed convenit nostrae plantae. Feuillei planta *peruv. 705. t. 1.* differe videtur.

## 361. BR. ERECTUS.

Folia radicalia *angusta* interdum pilosa, caulina *plana* saepe ciliata. Panicula *arcta ramis subsimplicibus subunifloris arrectis*, spiculae 10—14 florum, flosculi conniventes. Valvae longe acutatae carina superne scabrae. Valvula longe acutata nervis tribus saepe pubescentibus, *arista valvula brevior*.

Br. agrestis *Allion. ped. n.* 2224. *Host gr.* 1. 9. t. 10. *W. E. S.* 6. Br. perennis *Vill. delph.* 2. 122. Br. erectus *Smith R. S.* 2. 6. 37. *m.* 2. 335. *E. a.* 1. 24. Hab. in Europa australi praesertim orientali. 4. D.

## 362. BR. STENOPHYLLUS.

Folia radicalia *angusta*, caulina *plana*. Panicula *subeffusa*, ramis subsimplicibus subunifloris patentibus, spiculae 10—14 florum, flosculi conniventes. Valvae longe acutatae laevissimae. Valvula ext. breviter acutata trinervia, *arista valvula brevior*.

Br. stenophyllus *Linn. E. a.* 1. 94. *R. S. m.* 2. 358. Br. angustifolius *Hornem hafn. suppl.* 13, Hab. . . . 4. D. Ob confusionem vitandam Br. angustifolii nomen mutavi. Habitu valde differt a Br. agresti. Spiculae ad 2 poll. longae, quae in illo poll. et 2 lin.

## 363. BR. PURGANS.

Folia *vagina praesertim superne dense pilosa*, lamina *glabriuscula*. Panicula *ramis erectis elongatis*; spiculae 9 florum pilosae, flosculi inferiores demum patentes. Valvae mucronatae. Valvula ext. nervosa *obtusa subemarginata*, *arista valvula fere brevior*.

*B. purgans* Linn. *W. sp.* 1. 431. *W. E.* 1. 120. *E. a.* 1. 94. *R. S.* 2. 642. *m.* 2. 357. Hab. in Canada. 24. D. Valvula interior non ciliata sed pilosa parum inclusa.

## 364. BR. ASPER.

*Folia lamina lata pilosa. Panicula effusa ramis pendulis, spiculae 6florae, flosculi decidui. Valvae longe acutatae. Valvula ext. subnervia versus margines pilosa longe acutata, arista valvula brevior.*

*Br. asper* Linn. *W. sp.* 1. 432. *W. E.* 8. 6. *E. a.* 1. 94. *R. S.* 2. 643. *m.* 2. 357. *Host gr.* 1. 6. *t.* 7. *Br. versicolor* Pollich *pal.* 4. 109. *Br. nemorosus* Vill. *delph.* 2. 117. *Br. hirsutus* Curt. *lond.* 2. *t.* 8. Hab. in nemorosis Europae mediae. 24. D.

*Var. Br. hirsutissimus. Folia vagina dense pilosa, pilis reversis. Spiculae 8florae. Br. hirsutissimus* Cyrill. *R. S.* 2. 643. Hab. in Europa australi. 24. D.

## 365. BR. GIGANTEUS.

*Folia lamina lata scabra. Panicula nutans effusa, spiculae 6 — 7 florae, flosculi conniventes. Valvae acutae. Valvula ext. subnervosa piloso-scabra breviter acuta, arista valvula fere longior.*

*Br. giganteus* Linn. *W. sp.* 14. 1. 435. *W. E.* 121. *E. a.* 1. 94. *R. S.* 2. 644. *m.* 2. 358. *Schreb. gr.* 1. 88. *t.* 11. *Host gr.* 1. 6. *t.* 6. Hab. in nemorosis Europae mediae. 24. D.

## 366. BR. SECALINUS.

Folia lamina antrorsum scabra lineata *pilosiuscula*. Panicula *erecta*, ramis *patulis*; spiculae 10-florae, flosculis patentiusculis. Valva exterior trinervis acutiuscula, interior subquinenervia obtusa saepe mucronata. Valvula exterior subquinenervia, *mutica aut aristata*, arista valvulae minor.

Br. secalinus Linn. R. S. 2. 633. m. 2. 353. W. E. 1. 113. E. a. 1. 93. Host gr. 1. 10. t. 12. Hab. inter segetes in Europa. ☉. D. Variat spiculis glabris et pubescentibus, valvulis aristatis et muticis; arista in flosculis inferioribus saepe minima est. Br. velutinus Schrad. germ. 1. 349. R. S. 2. 634. m. 2. 634. varietas est spiculis molli pubescentibus.

## 367. BR. MULTIFLORUS.

Folia lamina laevi dense pilosa. Panicula *subnutans*, ramis *patulis*; spiculae 10—12 florae, flosculis conniventibus. Valva exterior trinervia subquinenervia, interior multinervia nervis parum expressis. Valvula exterior *basi explanata* subnervosa pilis parvis sparsis; arista valvulae subaequalis.

Br. multiflorus Willd. sp. 1. 428. Host gr. 1. 10. t. 11. Br. commutatus Schrad. germ. 1. 353. R. S. 2. 634. m. 353. W. E. 1. 119. E. a. 1. 93. Br. simplex Gaud. agr. 1. 296. Br. Gaudini R. S. 2. 635. m. 2. 352. Hab. inter segetes Europae. ☉. D.

Br. verticillatus Cavan. ic. 6. 66. t. 590. R. S. 2. 645. non differt nisi foliis minus dense pilosis, valvula exteriore laeviore magis acutata rubro-variegata; hinc varietas videtur.

## 368. BR. ARVENSIS.

Folia *vagina inferiorum dense pilosa, lamina pilosa*. Panicula *effusa*, spiculae 6—7 florum, flosculi conniventes. Valvae obtusiusculae. Valvula ext. glabra subnervosa *breviter acutata obtusiuscula, arista valvulae subaequalis*.

Br. arvensis Linn. *W. sp.* 1. 434. *W. E.* 1. 121. *E. a.* 1. 93. *R. S.* 2. 646. *m.* 2. 359. *Host gr.* 1. 15. *t.* 14. Hab. in Europa praesertim media. ☉. D.

## 369. BR. SQUARROSUS.

Folia *pilosa*. Panicula *ramis simplicibus unifloris elongatis patulis*, spiculae 12—14 florum, flosculi arrecti. Valvae acutiusculae. Valvula ext. *acutiuscula* glabra aut pilosa *arista valvula longior demum recurva*.

Br. squarrosus Linn. *W. sp.* 1. 430. *E. a.* 1. 93. *R. S.* 2. 640. *m.* 2. 356. *Host gr.* 1. 11. *t.* 13. Hab. in Europa australi. ☉. D.

## 370. BR. PENDULINUS.

Folia *scabra*. Panicula *effusa*, spiculae 6—8 florum *compressae*, flosculi conniventes. Valva ext. trinervia, int. quinquenervia, utraque longe acutata. Valvula ext. superne praesertim nervosa *piloso-scabra, arista fere ex apice valvula brevior*.

Br. pendulinus Sesse Lagasc. *nov. gen. et sp.* 4. *R. S.* 2. 644. *m.* 2. 358. *W. E. S.* 6. *E. a.* 1. 93. Hab. in Nova Hispania. ☉. D. Flosculi superiores facile decidunt. Spiculis valde compressis dignoscitur.

## 371. BR. TECTORUM.

Folia *pilis brevibus frequentibus scabra*. Panicula *effusa, ramis pendulis*, spiculae 6—8 florum,

flosculi tandem patententes. Valvae longe acutatae pilosae. Valvula ext. nervosa *pilosa apice longe acutato bifido, arista valvula longior.*

Br. tectorum *Linn. W. sp. 1. 434 W. E. 126. E. a. 1. 93. R. S. 2. 648. m. 2. 379. Host gr. 1. 13. t. 15.* Hab. frequens in Europa media et boreali. ☉. D.

## 372. BR. LAXUS.

Folia *scabra, pilis sparsis.* Panicula *nutans, ramis patentibus,* spiculae 6—8 florum, flosculi tandem patententes. Valvae longe acutatae pilis sparsis. Valvula ext. nervosa *pilis sparsis apice acutiusculo, arista valvula brevior.*

Br. laxis *Hornem. hafn. 2. 954. W. E. S. 6. E. a. 1. 93. R. S. 2. 641. m. 2. 357.* Hab. . . . 24. D. Affinis praecedenti sed perennis.

## 373. BR. GLAUCUS.

Herba *glauca.* Folia complicata *glabra.* Panicula *elongata, ramis brevibus patentibus,* spiculae 5—6 florum, flosculi subpatentes. Valvae longe acutatae glabrae. Valvula ext. *obtusiuscula pilosa, arista valvula brevior.*

Br. glaucus *Sprengel.*

Hab. . . . 24. D. Planta a reliquis valde distincta hoc nomine in hortis non infrequens.

## 374. BR. INERMIS.

Caulis *stolonifer.* Folia lata *scabra.* Panicula *ramis arrectis,* spiculae 10—12 florum, flosculi demum patententes. Valvae acutiusculae. Valvula ext. *obtusiuscula subemarginata nervosa, arista brevissima aut nulla.*

Br. inermis *Linn. W. sp.* 1. 431. *W. E.* 120. *E. a.* 1. 94. *Schreb. gr.* 1. 97. *t.* 13. *Host gr.* 1. 8. *t.* 9. *Schedonorus inermis R. S.* 2. 701. *m.* 2. 389. Hab. in Europae mediae arenosis. 4. D. Valvula interior nervis submarginalibus piloso-ciliatis.

## 92. SCHOENODORUS.

*Panicula* explicata. *Spiculae* multiflorae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales valvulis inferioribus breviores. *Glumella* bivalvis, valvula exterior ex apice aristata; callus non separatus; pedicelli flosculorum apice fasciculis pilorum 3. *Parapetala* oblonga bidentata. *Styli* plumosi.

### 375. S. VIOLACEUS.

Folia vagina laevis, lamina radicalium convoluta, ligula biaurita piloso-lacera. *Panicula* ramis brevibus. *Spiculae* 3—4 florum. Valvae acutatae. Valvula exterior ovalis laevis violacea, arista valvula brevior, interior subaequalis nervis submarginalibus ciliatis.

*Festuca poaeformis Host. gr.* 2. 58. *t.* 81. *E. a.* 1. 92. *Festuca pilosa Gaudin agr.* 1. 276. *Festuca rhaetica De Cand. fr. n.* 1590. *Mertens et Koch. germ.* 1. 661. *Poa violacea Bellard. app.* 8. *t.* 1. *sec. spec. Bellard. in Herb. Willd.* *Sclerochloa poaeformis R. S.* 2. 705. *m.* 2. 390. Hab. in Alpibus Europae mediae. 4. D.

## 93. TRIDENS.

*Panicula* expansa. *Spiculae* 5—6 florum. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales, exterior paullo minor.

*Glumella* bivalvis, valvula exterior *aristulis tribus ex nervis dorsali et lateralibus*. *Parapetala* ovalia acumine tenui. *Styli* penicillares.

### 376. TR. QUINQUEFIDUS.

Folia vagina laevi ad oras pilosa, ligula truncata pilosissima. Panicula ramis arrectis. Spiculae teretes. Valvae acutae uninerviae. Valvula exterior quinquefida e dentibus 2 et aristulis 3.

Tr. quinquefida *R. S.* 2. 599. *m.* 2. 333. *E. a.* 1. 89. *Tricuspis Beauv. agrostogr.* 78. *Poa* quinquefida *Pursh. am.* 1. 81. *Poa seslerioides Mich. am.* 1. 68. *Triodia cuprea Jacq. eclog. gram. f.* 2. p. 21. t. 16. Hab. in pratis montosis Novae Angliae ad Carolinam usque. 4. D. T.

### 94. GLYCERIA.

*Panicula* expansa. *Spiculae cylindricae multiflorae; pedicelli flosculorum basi articulatim secedentes*. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales obtusae flosculis infimis breviores. *Glumella* bivalvis, basi callo evidenti separato instructa, valvulae subaequales *obtusae muticae*. *Parapetalum unicum truncatum*. *Styli dichotomi plumosi*.

Valvae uninerviae membranaceae. Valvulae multinerviae. Genus *Hydrochlois* genuinis proximum, et fortasse cum his combinandum, differt forma spiculae, parapetalis et stylo.

### 377. GL. FLUITANS.

Folia laevia, ligula elongata lacera. Panicula elongata, ramulis aliis patentibus aliis adpressis.

*Gl. fluitans* *R. Brown prodr.* 1. 179. *R. S.* 2. 695. *m.* 2. 387. *E. a.* 1. 89. *Festuca fluitans* *Linn. Schreb. gr.* 1. 37. *t.* 3. *Host gr.* 2. 53. *t.* 77. *Poa fluitans* *Smith W. E.* 105. Hab. in inundatis Europae borealis et mediae. 4. D. Valvula utraque integra.

---

## 95. HYDROCHLOA.

*Panicula* effusa. *Spiculae* multiflorae compressae. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales obtusissimae uninerviae membranaceae, flosculo infimo breviores. *Glumella* bivalvis, valvulae subaequales muticae multinerviae nervis exquisitis. *Parapetala* 2 truncata. *Styli* simplices penicillares.

## 378. H. AQUATICA.

Folia scaberrima ligula brevi rotundata. *Spiculae* quinqueflorae. Valvulae obtusae.

*H. aquatica* *Hartmann. gr. suec.* 8. *Poa aquatica* *Linn. W. E.* 103. *E. a.* 1. 85. *R. S.* 2. 559. *m.* 2. 320. *Host gr.* 2. 44. *t.* 60. Hab. in Europa boreali et media ad aquas.

---

## 96. POA.

*Panicula* effusa, rarius arcta. *Spiculae* tri-multiflorae aut biflorae pedicellis tertii quartique flosculi; rachis sub flosculo articulatum soluta. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales flosculis infimis parum breviores. *Glumella* bivalvis, basi callo obsoleto, valvulae subaequalos muticae.

*Parapetala* ovalia acuta basi gibba. *Styli* plumosi.

Valva exterior uninervia paullo minor, interior trinervia. Valvula exterior quinquenervia.

*Subgen. 1. MILIACEAE.*

*Spiculae biflorae.*

379. P. MILIACEA.

Folia breviter angusta laevia, ligula longiuscula obtusa. Panicula effusa. Valvae obtusae laeves. Valvulae laevissimae, apice truncato-denticulato, interior inclusa.

*Aira miliacea Villars delph. 1. 303. sec. spec. auctor.* *Poa nemoralis R. S. 2. 546. m. 2. 304.* Hab. in Gallia australi, Italia. 24. D. Valvulae margine flavescens. A. *Poa nemoralis* differt valvula ext. apice truncato denticulato. Haud dubito de synonymo R. S.

*Subgen. 2. AIROIDEAE.*

*Spiculae cylindricae multiflorae. Valvula exterior margine lato membranaceo.*

380. P. DELAWARICA.

Folia breviter conduplicata laevia, ligula mediocris obtusa. *Panicula ramis arrectis strictis.* Valvae nervosae acutiusculae. Valvula ext. breviter acuta, interior obtusa subinclusa.

Hab. in Americae borealis provincia Delaware. Hort. Erg. 24. T. Caulis erectus, pedem altus. Folia radicalia 3—4 poll. longa, caulina decrescentia summa brevissima, omnium vaginae laeves. Panicula ramis paucis subsimplicibus. Spiculae minores ac in specie prima. Valva ext. minor carinata, interior trinervis.

Valvula ext. carinata nervo in brevem acumen desinente, lateralibus obsoletis margine scabro praesertim superne, inter. obtusa nervis duobus scabris.

## 381. P. DISTANS.

Caulis *non stoloniferus*. *Panicula ramis floriferis patulis, fructiferis reflexis*. Poa distans Linn. *W. E.* 103. *E. a.* 1. 85. *R. S.* 2. 544. *m.* 2. 302. *Host gr.* 2. 46. *t.* 63. Poa salina Pollich Roth germ. 2. 119. Aira aquatica  $\beta$ . Huds. Linn. syst. ed. XII. 2. 91. Glyceria distans Wahlenb. ups. 36. Mertens et Koch germ. 1. 588. Hab. in uliginosis Europae mediae et borealis. 4. D. Spiculae 6florae 2—3 lin. longae. Valvulae obtusissimae margine membranaceo, exterior nervis tribus basi praesertim pilosa.

## 382. P. MARITIMA.

Caulis *stoloniferus*. *Panicula ramis floriferis patentibus, fructiferis contractis*. Spiculae *quinqueflorae*.

Poa maritima Huds. *R. S.* 2. 560. *m.* 2. 313. *W. E.* 107. *E. a.* 1. 85. *Flor. dan. t.* 1606. Hab. in Europae praesertim mediae maritimis. Affinis praecedenti, folia angustiora, spiculae 5—6 lin. longae.

## 383. P. FESTUCAEFORMIS.

Caulis *stoloniferus*. *Panicula ramis ante et post florescentiam contractis*. Spiculae *9florae*.

Poa festucaeformis Host gr. 3. 12. *t.* 17. *W. E.* 106. *E. a.* 1. 86. *R. S.* 2. 661. Hab. in Dalmatia prope Zaram. 4. D. Multo major P. maritima et distante. Spiculae 4—5 lin. longae. Valvula exterior basi praesertim nervis eminentibus, duobus interdum villosiusculis, pili breves circa basin valvulae.

Subgen. 3. *TRUNCATAE*.

*Spiculae biflorae, pedicellus unus alterve sine flosculo.*

384. *P. OBTUSATA*.

Folia angusta scabra, ligula brevissima. *Pedicellus brevis pone flosculum inferiorem, longior pone superiorem.*

*Aira obtusata Michaux amer. 1. 62. Airopsis obtusata R. S. 2. 578. m. 2. 320. Aira pensylvanica Sprengel Mem. d. Petersb. p. 1810. 299. t. 7. Koeleria pensylvanica De Cand. monsp. 117. R. S. 2. 621. m. 2. 346. Aira truncata Muehlenb. descr. 83. W. E. S. 7. E. a. 1. 78. Hab. in Pennsylvania. 24. T. Valvae dorso exasperatae obtusiusculae. Valvula ext. obtusa, int. membranacea bifida. Aira mollis Muehlenb. non multum differt.*

385. *P. SEMINEUTRA*.

Folia scabra, ligula elongata acuta. *Pedicellus pone flosculum inferiorem. Valvulae basi lanatae.*

*Aira semineutra Kitaib. W. E. 100. E. a. 1. 78. Poa semineutra Trin. agrost. 12. Phalaris semineutra R. S. 2. 406. m. 2. 217. Hab. in pratis Hungariae. 24. D. Panicula ramis brevibus. Valvae nervosae acutae. Valvula ext. acuta nervosa, int. obtusa.*

Subgen. 4. *ARUNDINACEAE*.

*Spiculae triflorae, flosculo tertio masculo. Valvulae basi glabrae.*

386. *P. ARUNDINACEA*.

Folia scaberrima, ligula abbreviata pilosa. Valvae et valvulae obtusae subdenticulatae, illae enerviae hae subnervosae.

*Aira*

*Aira arundinacea* Linn. *R. S.* 2. 684. *mant.* 2. 396. *Marsch. t. c.* 1. 57. 3. 63. *E. a.* 1. 79. Hab. in arena mobili deserti Cumani. 4. T.

*Subgen. 1. GENUINAE.*

*Panicula* explicata. *Spiculae* tri-multiflorae ovales et oblongae.

387. P. TRIVIALIS.

Caulis superne scabriusculus. Folia *vagina scabra, ligula elongata* acuta. *Spiculae triflorae*. Valvula exterior ad basin villis crispis, nervo dorsali inferne villosiusculo.

*P. trivialis* Linn. *R. S.* 2. 534. *m.* 2. 300. *W. E.* 104. *E. a.* 1. 85. *Host gr.* 2. 45. *t.* 62. *P. pratensis* Roth *germ. II.* 2. 113. *P. dubia* Leers *herb. t.* 6. *f.* 5. Hab. in pratis uliginosis totius Europae praesertim mediae. 4. D. Stolones nulli. Folia lamina scabra. Valvae scabriusculae acutatae. Valvula exterior acuta virens apice tantum aureo.

388. P. ASPERA.

Caulis *superne scaberrimus*. Folia *vagina scabra, ligula longiuscula* obtusata. *Spiculae triflorae*. Valvula exter. ad basin villo crispo, nervisque villosis superne glabrescentibus.

*P. aspera* Gaudin *agr.* 1. 198. *P. Gaudini* *R. S.* 2. 548. *m.* 2. 305. *P. caesia* Smith *Wahlenb. suec.* 58. Hab. in Alpibus Helvetiae. 4. D. Folia lamina brevi superne pilis brevibus scabro-pubescente. Spicae 3 lin. longae. Valvae scabrae praesertim nervo dorsali, acutae. Valvula exterior scabriuscula, limbo aureo, margine membranaceo, obtusa, nervo laterali

medio minus villosus, saepe toto aut fere toto glabrescente. *P. aspera* Jacq. est *Eragrostis*.

### 389. *P. PRATENSIS*.

Caulis stoloniferus. Folia superiora *vagina laevi*, *ligula brevi rotundata*. Panicula effusa. *Spiculae quinqueflorae*. Valvula exterior ad basin villis crispis nervoque dorsali submarginalique inferne praesertim villosis, lateralibus expressis.

*P. pratensis* *Linn. R. S. 2. 532. m. 2. 298. W. E. 104. E. a. 1. 85. Host gr. 2. 44. t. 61. P. trivialis Roth germ. 2. 113.* Hab. in totius Europae pratis excepta australiori. 4. D. Variat foliis radicalibus filiformibus et latioribus, caulinis planis aut convolutis, vagina inferiorum scabra aut laevi, herba glaucescente, spiculis magis minusve compressis, nervo submarginali magis minusve villosus tum colore spicularum praesertim violaceo et simul quoque aureo. Stylum dichotomum in hac et aliis inveniri monuerunt Mertens et Koch. *P. viridis E. a. 1. 85.* huc spectat.

### 390. *P. COMPRESSA*.

Caulis stoloniferus *compressus*. Folia *vagina laevi*, *ligula brevi truncata*. Panicula contracta. Spiculae 5—7 florum. Valvula ext. ad basin saepe villis crispis, nervo dorsali et submarginali inferne villosulis, lateralibus expressis.

*P. compressa Linn. W. E. 108. E. a. 1. 86. R. S. 2. 558. m. 2. 210. Host gr. 2. 56. t. 70.* Hab. in rupibus, muris, collibus siccis Europae mediae. 4. D. Floret post *P. serotinam*.

## 391. P. PALUSTRIS.

Folia *vagina laevi, superiora ligula elongata acuta*. Spiculae 2—5florae. Valvula exterior ad basin villis paucis, nervo dorsali et submarginali inferne villosis, lateralibus evanidis.

P. palustris *Roth germ. II. 1. 117. W. E. 105. E. a. 1. 86.* P. fertilis *Host gr. 3. 10. t. 14. Mertens et Koch germ. 1. 514.* P. serotina *Gaudin agrost. 1. 108.* Hab. in pratis paludosis Europae mediae et borealis. 4. D. Valde affinis P. serotinae, an varietas? Linnaeus P. palustrem non vidit at adducit *C. Bauh. prodr. 7. et Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 27.* synonyma huc pertinentia, hinc non video cur nomen a multis Botanicis acceptum mutare velis.

## 392. P. LIMBATA.

Caulis *ramosus!* Folia *vagina scabriuscula, ligula elongata acuta*. Spiculae 5florae. Valvula ext. ad basin villo vix ullo, nervo dorsali et submarginali parum villosa, lateralibus subevanidis.

Hab. in Nepalia. 4. T. Valde affinis praecedenti et forte varietas. Panicula fere in omnibus convenit, caule ramoso statim dignoscenda.

## 393. P. SEROTINA.

Caulis stoloniferus. Folium summum elongatum angustum, *vagina scabriuscula, ligula brevi truncata*. Spiculae 2—5florae rarissime uniflorae. Valvula exterior ad basin villis paucis, nervo dorsali et submarginali inferne villosis, lateralibus evanidis.

P. nemoralis *Gaud. agrost. 1. 208. Mertens et Koch. germ. 1. 615.* Valvula exterior fere semper

tincta macula aurea nec violacea, folium summum lin. latum. A. P. pratensi differt habitu magis laxo praesertim vaginis laxis, nervis lateralibus evanidis et tempore florendi seriore. Hinc nomen mutare nolim, praesertim cum a typo, nec a varietate et habitu proprio nomen desumendum sit.

*Typus.* Panicula flaccidior. Spiculae 4—5 florum. Folium summum arrectum.

P. serotina *Ehrh. Schrad. germ.* 1. 299. *R. S.* 2. 553. *m.* 2. 307. excl. syn. P. palustris. Hab. in sylvis humidis Europae mediae. 4. D.

Var. 1. *Coarctata.* Panicula coarctata, P. nemoralis coarctata *Gaud., Mert. et Koch. l. c.*

P. coarctata *Hall. fil. De Cand. fr.* 6. 273. *E. a.* 1. 86. In sylvis paludosis.

Var. 2. *Nemoralis.* Panicula expansa non flaccida, ut in typo. Spiculae 2—3 florum. Folium summum divaricatum.

P. nemoralis vulgaris *Gaud., Mert. et Koch l. c.*  
P. nemoralis *Linn. R. S.* 2. 546. *m.* 2. 303. *W. E.* 108. *E. a.* 1. 86. In sylvis siscioribus.

Var. 3. *Uniflora.* Panicula tenuis. Spiculae uniflorae. Valvae totae virides. Valvae acutissimae glumellam superantes.

Singularem hancce varietatem prope Fuerstenstein Silesiae reperi.

### 394. P. GLAUCA.

*Herba glauca.* Folium summum breve latiusculum, vagina scabriuscula, ligula brevi truncata. Panicula ramis strictis. Spiculae 5 florum. Valvula exterior ad basin villis paucis, nervo dorsali et sub-

marginalibus inferne parum villosis, lateralibus subevanidis.

*P. glauca* *Fl. dan. t. 964. Wahlenb. lapp. 41. Smith engl. fl. 1. 128. var. α.* *P. nemoralis caesia Gaud., Mert. et Koch germ. 1. 619.* Hab. in pratis montosis et borealibus Europae. 4. D. Habitu stricto, praesertim paniculae ramis strictis, folio summo 2 lin. lato et latiore nec non brevi 1—2 poll. longo, villo nervorum valvulae parciore, nervis lateralibus magis expressis a praecedente differt, quamquam color variet. Stolones nulli.

### 395. P. ANNUA.

Folia *vagina laevi, ligula longiuscula denticulata.* Panicula *ramulis patentibus secundis.* Spiculae 3—5—7 florum. Valvula exterior *obtusissima* ad basin villo vix ullo, nervo dorsali et submarginali inferne villosulis, lateralibus expressis.

*P. annua Linn. R. S. 2. 535. m. 2. 301. W. E. 106. E. a. 1. 86. Host gr. 2. 46, t. 64.* Hab. in graminosis, ad vias totius Europae. ☉. D. Caulis compressus mollis. Paniculae rami 1—2. Valvae et valvulae obtusissimae.

*Var. Supina.* Spiculae longiores 5—7 florum, valvula exterior e violaceo-variegata.

*P. annua varia Gaudin agr. 1. 189. Mertens Koch. germ. 1. 599. P. supina Schrad. R. S. 2. 543. m. 2. 302. Host gr. 4. 16. t. 27.* Hab. in Alpibus Germaniae et Helvetiae. Caulis in nostris minime stolonifer.



















Hab. in Montevideo. Sellow. 2. D. Plantae 3—4 ped. alta. Folia vagina glabra laxa, lamina angusta vix 2 lin. lata tandem conduplicata, ad oras pilis sat longis. Panicula ramis binis aut solitariis longissimis non capillaribus nec flexuosis sed ob longitudinem fere dependentibus laevibus glaberrimis, nec ad exortum pilosis. Spiculae 3 lin. et ultra longae. Valva ext. angustior longius acutata, interior valvulae ext. simillima. Valvula ext. latiuscula margine membranacea breviter acuta non ita expresse trinervia.

## 418. ER. FILIFORMIS.

Folia *demum convoluta filiformia*, vagina ora longe ciliata. Panicula *ramis arrectis glabris*. Spiculae *lineares* 5—6 *florae*. Valvae uninerviae submembranaceae acutae inaequales. Valvula exterior *obtusa* subnervia margine colorata.

*Poa tenella Pursh am. 1. 80.* sec diagnosin. *Poa punctata E. a. 1. 87.* sed non videtur *P. punctata Linn. fil.* Nec est *Poa tenella Linn.* Hab. in America boreali. ☉. D.

## 419. ER. AEGYPTIACA.

Panicula *arcta ant expansa, ramis strictiusculis, inferioribus ad basin usque floriferis*. Spiculae *novemflorae lineares*. Valvae uninerviae membranaceae obtusiusculae, exterior duplo minor. Valvula exterior *obtusiuscula* trinervia.

*Poa aegyptiaca W. E. 107. E. a. 1. 87. R. S. 2. 566. m. 2. 314.* Hab. in Aegypto ad ripas Nili in arena. ☉. T. Secundum characteres affinis *Er. pi-*





Caulis 1—2 ped. altus compressus dense foliosus. Vaginae striatae laeves; ligula pilosa; lamina basi ciliata pilis longis margine scaberrima. Panicula ramis inferioribus binis, summis plerumque ternis 2 poll. et 6 lin. longis indivisis, rachi superne angulata. Spiculae 2—3 lin. longae. Valva exterior brevius acutata, interior longior et longius acutata. Valvula exterior aristula prope apicem sita ceterum carinata, carina subscabra; valvula interior bifida nervo submarginali pubescente, persistens ut solet in hoc genere.

### 98. BRIZA.

*Panicula* subexplicata et explicata. *Spiculae* multiflorae *cordatae*. *Gluma* bivalvis, valvae aequales flosculis inferioribus subaequales. *Glumella* bivalvis basi callo nullo, *valvulae muticae margine toto explanatae*; interior paullo minor; valvae valvulaeque convexae. *Parapetala* basi gibbosiuscula longe acutata. *Styli* ad basin fere plumosi.

### 426. BR. MINOR.

Folia *ligula longe acutata*. Panicula *effusa*, ramis ultimis capillaribus. Spiculae 6—8 *florae*. Valvae et valvulae obtusissimae margine lato membranaceo.

Br. minor *Linn. W. E.* 110. *E. a.* 1. 88. *R. S.* 2. 521. *m.* 2. 294. *Host gr.* 2. 22. *t.* 28. Hab. in Europae australis pratis. ☉. D. Folia latiora ac in sequente 3 lin. lata. Spiculae 2 lin. longae 2 latae. Valvulae saepe pilis brevissimis tectae. Br. *virens* *Linn.* non differt.



## 430. BR. HUMILIS.

*Folia ligula brevi rotundata, lamina convoluta. Panicula ramis brevibus subspicata. Spiculae 6—8-florae. Valvulae obtusae margine apicis membranaceo.*

Br. humilis *Marsch. t. c. 1. 66. 3. 70. R. S. 5. 521. m. 2. 294.* Br. spicata *Smith. gr. 1. 57. Sibthorp. gr. 1. t. 77. R. S. 521.* Hab. in Monte Par-nasso, Tauria meridionali et Iberia media. ☉. T. Spiculae 2 lin. longae 2 latae.

## 99. MOLINIA.

*Caulis nodis haud prominulis. Panicula explicata. Spiculae 2—3-multiflorae, interdum cum floris rudimento. Gluma bivalvis, valvae inaequales flosculis longe breviores. Glumella bivalvis, valvulae subaequales muticae. Parapetala parva truncata. Styli penicillares.*

Pedicelli flosculorum superne ad basin valvulae exterioris pilis paucissimis saepe nullis. Valvula interior nom membranacea sed virens basi et superne implexa.

## 431. M. COERULEA.

*Folia breviora. Spiculae biflorae.*

M. coerulea *Moench. Wahlenb. upsal. 30. Eno-dium coeruleum Gaudin. R. S. 2. 531. m. 2. 297. E. a. 1. 79.* Melica coerulea *Linn. mant. 2. 325. Host gr. 2. 7. t. 8. W. E. 102.* Aira coerulea *Linn. sp. ed. 2. 95.* Hab. in Europae frigidioris paludibus turfosis.

## 432. M. ALTISSIM.

*Folia elongata. Spiculae multiflorae.*

*Enodium sylvaticum Link E. a. 1. 80. R. S. m. 2. 297. E. coeruleum β. R. S. 2. 531. Melica coerulea β. W. sp. 1. 301. Habitat in Europae australioris paludibus turfosis. 4. D. Folia multo longiora et latiora ac in praecedente, tota planta multo major. Haec ex Europa australiori. In Europa boreali occurrit planta huic simillima, sed non ita magna, foliis non tam strictis et copiosis, an diversa? Si differt, M. sylvatica vocanda.*

## 100. CATABROSA.

*Panicula effusa. Spiculae biflorae. Gluma bivalvis, valvae inaequales, flosculis multo breviores. Glumella bivalvis, valvulae subaequales muticae, interior emorsa exteriori similis et aequalis.*

## 433. C. AQUATICA.

*Folia laevia, ligula longiuscula obtusa. Valvae obtusae laeves. Valvulae nervosae apice scarioso truncato-denticulato.*

*Catabrosa aquatica Beauv. R. S. 2. 696. m. 2. 388. Aira aquatica W. E. 376. E. a. 1. 78. Host gr. 2. 30. t. 41. Hab. in uliginosis Europae borealis et mediae. 4. D.*

## Subordo IV. ECHINARIACEAE.

*Panicula spiciformis. Valvula exterior multiaristata.*

## 101. ECHINARIA.

*Panicula capitata. Spiculae multiflorae. Gluma bivalvis, valvae subaequales breviter aristatae. Glumella bivalvis, valvula exterior aristis 5 crassis rigidis, interior implexa, aristis 2. Styli pilosi.*

## 434. E. CAPITATA.

Folia vagina sulcata scabra, ligula brevi truncata. Capitulum globosum. Valvulae aristis reflexis.

E. capitata *Desfont. atl. 2. 385. R. S. 2. 617. m. 2. 343. E. a. 1. 83.* Sesleria echinata *Host gr. 3. 6. t. 8. W. E. 112.* Cenchrus capitatus *Linn. Vahl. en. 2. 304.* Hab. in Europa australi et Africa boreali. ☉. T.

## Subordo V. CYNOSUROIDEAE.

*Spiculae bracteis suffultae saltem in basi inflorescentiae.*

## 102. CYNOSURUS.

*Panicula arcta. Spiculae bi-multiflorae fultae bracteis pinnatis e floribus imperfectis. Gluma bivalvis, valvae flosculis parum breviores longioresve. Glumella bivalvis, valvula exterior saepe aristata; interior dorso parum impressa. Parapetala lanceolata acuta. Styli plumosi aut pilosi.*

## 435. C. CRISTATUS.

*Paniculae cylindricae ramuli-brevissimi sustinentes spiculas duas 4floras et bracteam aequalem pinnatam sterilem, pinnis acutis. Valvae longe*







*S. sphaerocephala* *Arduin. R. S. 2. 605. E. a. 1. 84. Host gr. 2. 70. t. 99. Sturm. germ. fasc. 6.*  
*Hab. in Alpibus Noricis. 24. T. Flores coerulescentes.*

---

## Sectio V.

# S U B B I F L O R A E.

*Inflorescentia* spicata aut paniculata monoclina. *Spiculae* subbiflorae nudae rarius subtriflorae. *Flos alter* masulus aut neuter fertili structura dissimilis.

---

## Subordo I. PANICEAE.

*Spiculae* subbiflorae. *Glumella* fertilis valvulis plerumque cartilagineis. *Glumellae* neutrius valvula exterior valvae interiori structura similis.

---

### 104. ORTHOPOGON.

*Spica composita. Gluma* bivalvis, valva *exterior minor longe aristata*, interior major brevius plerumque aristata. *Glumella* fertilis bivalvis, valvulae aequales muticae altera convexa altera plana. *Glumella* neutra uni-bivalvis, valvula exterior *saepe aristata*, interior minor membranacea aut deficiens. *Styli* penicillares.

### 444. O. UNDULATUS.

*Caulis longe repens. Folia pubescentia breviter lata. Spicae* binae ternaeve brevissimae, rachis sub spiculis pubescens. Valvae (et valvula ext. neutra) oblongae nervosae laeves aristatae.





















margine scarioso pallido, acuta scabriuscula haud carinata linea utrinque elevata; interior aureo-virens, margine scarioso pallido, acuta lineata, pilis brevissimis arrectis in quavis linea. Valvula ext. glumellae neutrius pallens superne virens acuta laevissima glabra; interior membranacea. Glumella fertilis uti solent cartilaginea laevissima, glumella sat minor.

## 107. PENNISETUM.

*Inflorescentia* spicata. *Involucrum e setis pluribus includens spiculas* 1—2 bifloras. *Gluma* bivalvis, valva exterior minor. *Glumella* fertilis bivalvis, *valvulae aequales* non cartilagineae nervosae. *Glumella* mascula aut neutra uni-bivalvis, valvula interior minor membranacea saepe deficiens. *Stylus* 1.

Pennisetum a Setaria distinguendum, non setis plumosis, nec stylo unico, sed quod singulari habitu glumellae fertilis careat. Ligulae loco pili.

## 470. P. CILIARE.

Folia *pilosa*, vagina margine lanata. Spica subdisticha. Setae spiculis longiores *basi plumosae apice scabrae, unica longiore paleacea*. Spiculae *binae*.

P. cenchroides *Richard. Pers. syn.* 1. 72. *R. S.* 2. 259. *m.* 2. 148. *Panicum vulpinum W. E.* 1. 103. *E. a.* 1. 75. *Cenchrus ciliaris Linn. W. sp.* 1. 318. Habitat in Caribaeis, Cumana. ☉. C. Setae rubentes.















sed lamina caulem spicamque longe superans 6—7 poll. longa 4 poll. lata. Spica brevis 2 poll. longa inter folia superne recondita. Setae virentes. Spiculae lin. longae. Valva extima duplo minor acutiuscula, interior et valvula neutra exterior lanceolatae nervosae obtusiusculae, utraque valvulis fertilibus breviores. Valvula fertilis parum longior interiore acutiuscula.

---

## 109. PENICILLARIA.

*Panicula spiciformis. Involucrum e setis pluribus. Spiculae binae biflorae, altero flore masculino aut neutro, altero fertili. Gluma bivalvis, glumella multo minor. Glumella mascula bivalvis, neutra univalvis, valvula glumellae fertili aequalis. Glumella fertilis bivalvis, valvula exterior nervosa, interior implexa. Antherae pilis fasciculatis. Styli 2 penicillares.*

## 491. P. SPICATA.

Caulis nodis pilosis. Folia *hirsuta vagina pubescente*. Spica crassa cylindracea, rachi hirta, spiculae superiores steriles. Setae scabrae spiculis parum breviores. Flos alter masculus. *Valvulae ciliatae*.

P. spicata *W. E.* 1037. *E. a.* 1. 78. *R. S.* 2. 498. *m.* 2. 282. Pennisetum typhoideum *Pers. sp.* 1. 72. Holcus spicatus *Linn. W. sp.* 4. 928. Hab. in India orientali. ☉. T.

## 492. P. PLUKENETI.

Caulis nodis pilosis. Folia *scabra*. Panicula cylindracea, spiculis inferioribus saepe sterilibus. Se-





nervia margine sublanato. Valvulae fertiles acutiusculae purpurascentes.

*Digitaria filiformis Muehlenb. descr. 131. D. pilosa Michaux amer. 1. 45. D. villosa Pers. syn. 1. 85. Paspalus filiformis Flügg. R. S. 2. 304. m. 2. 170. Hab. in America boreali. ☉. T. Folia brevissima sed angustiora ac in praecedente. Spicae tenues breviores ac in permultis, poll. 6 lin. longis, spiculae magis ab invicem remotae parum ultra lin. longae.*

#### 498. D. INAEQUALIS.

Folia inferiora vagina hirsutissima, lamina pilosa, superiora longa. Spicae subalternae quinae, in rachi ad basin pedicelli bractea minima. Valva ext. vix ulla, interior glumella duplo minor margine sublanata. Valvula neutra lanceolata subquinenervia margine sublanato. Valvulae fertiles lanceolatae acutae.

*Paspalus inaequalis E. a. 1. 103. Hab. in Manila ubi D. d. Chamisso invenit et inde attulit. ☉. C. Cum reliquae species quae valva extima carent ad Digitarias reduxerim praesertim ob spiculas geminas, hanc quoque huc retuli. Folia superiora praesertim longa caulem longe superantia; ligula longa obtusa. Spicae parum ultra poll. longa. Bractee in rachi squamarum instar candidarum minutissimae candidissimae. Valva interior glumella fertili duplo brevior acuta seu acutiuscula, margine sublanato. Valvula neutra magnitudine valvulae fertilis margine simili modo lanata.*



planta ita confusa, ut nomen rejiciendum sit. Pili singulares quasi alieni.

### 501. D. FIMBRIATA.

Caulis basi repens, geniculis subbarbatis. Folia inferiora vagina pilosa, superiora saepe glabra, lamina omnium basi pilis sparsis. Spicae alternae 5—7 patentes. Valva ext. minima, interior glumella duplo minor superne pilose. Valvula neutra lanceolata quinquenervia acuta *ciliato-fimbriata*.

Hab. in Brasilia. ☉. D.

Caulis pedalis et ultra. Vaginae striatae lamina breviuscula. Spicae ad 3 poll. et ultra longae. Valvula neutra rubens, fertiles virentes. Fimbria fit e pilo longo valvulae margini parallelo, pilis minimis sub angulo recto cum valvularum margine conjuncto; aute florescentiam sub margine valvulae occulta est.

### 502. D. CILIARIS.

Folia pilosa. Spicae alternae plures patentes. Valva exterior minuta, interior glumella duplo et quadruplo minor hirta. Valvula neutra oblonga acuta quinquenervia *nervo submarginali rigide ciliato, margine lanato*. Valvulae fertiles lanceolatae acutae virentes.

D. ciliaris *W. E.* 93. *E. a.* 1. 102. *R. S.* 2. 472. *m.* 2. 262. *Panicum ciliare Retz. W. sp.* 1. 344. *Syntherisma ciliare Schrad. germ.* 160. *t.* 3. *f.* 7. Hab. praesertim in Europa australi. ☉. D. *Ciliis valvae neutralis rigidis basi tuberculatis, tuberculo pilis parvis tecto, a reliquis sat differt.*



plures. Valva ext. minima, interior glumella duplo minor apice subpilosa. Valvula neutra oblonga acuta septemnervia purpurascens, margine sublanato. Valvulae fertiles oblongae acutae subpurpurascens.

*D. sanguinalis* Scop. *W. E.* 92. *E. a.* 1. 102. *R. S.* 2. 69. *m.* 2. 259. *Panicum sanguinale* Linn. Schreb. *gr.* 119. *t.* 16. *Syntherisma sanguinale* Schrad. *germ.* 161. Hab. in Europae cultis et agris. ☉.

### 506. D. AEGYPTIACA.

*Caulis erectus. Folia inferiora vagina pilosa, lamina subpilosa, superiora vagina glabra, lamina scabra.* Spicae alternae plures. Valva exterior minuta, interior glumella 3—4plo minor glabra. Valvula sterilis oblonga acuta quinquenervia virens, *margine scabro.* Valvulae fertiles oblongae acutae virentes.

*D. aegyptiaca* *W. E.* 93. *E. a.* 1. 181. *R. S.* 2. 471. *m.* 2. 260. *Panicum aegyptiacum* Retz. *W. sp.* 1. 343. *Panicum filiforme* Jacq. *obs.* 3. 8. *t.* 30. Hab. in Europa australi, Oriente. ☉. *D.* Caule erecto et glabritie valvarum et valvulae neutrius differt a praecedente. Roxburghi synonymon non huius loci est.

*Div. 2. Valva interior glumellae aequalis.*

### 507. D. GLABRA.

*Caulis erectus aut adscendens. Folia glabra.* Valva ext. minima, interior et valvula neutra oblongae acutae septemnerviae purpurascens, *margine sublanato.* Valvulae fertiles oblongae acutae purpurascens.

*D. glabra* *R. S.* 2. 471. *m.* 2. 261. *D. humifusa* *W. E.* 93. *E. a.* 1. 102. *Syntherisma glabrum* *Schrad. germ.* 163. *t.* 3. *f.* 6. Hab. in Europae cultis. ☉. D.

508. *D. MOLLISSIMA.*

*Caulis diffusus. Folia vagina pilis densis mollissimis, lamina pilosa. Spicae alternae plures tandem divaricatae saepe compositae. Valva ext. minuta, interior et valvula neutra oblongae acutae quinquenerviae purpurascens, margine lanato. Valvulae fertiles oblongae acutae virentes.*

*D. mollissima* *Schrad. goett.* Hab. . . . ☉. C. Vaginarum pubescentia ab affinibus diversa.

509. *D. MARGINATA.*

*Caulis repens. Folia inferiora vagina pilosa, lamina glabriuscula, superiora vagina glabra lamina scabra. Spicae alternae plures rachi flexuosa. Valva ext. minuta, interior et valvula neutra lanceolatae acutatae quinquenerviae virentes, margine fimbriato - ciliato. Valvulae lanceolatae acutatae virentes.*

*D. marginata* *E. a.* 1. 104. *R. S. m.* 2. 262. Hab. in Brasilia. ☉. D. Caulis longe repens. Fimbria valvae ut in *D. fimbriata*.

510. *D. VIOLASCENS.*

*Caulis basi repens. Folia vagina superne pilosa, lamina scabra. Spicae alternae plures tenuissimae, rachi flexuosa. Valva ext. vix ulla, interior et valvula neutra lanceolatae acutae septemnerviae virentes, margine subciliato. Valvulae fertiles lanceolatae acutae purpurascens.*

Hab. in Brasilia. ☉. D. Caulis ad 2 ped. altus. Spicae 4—5 poll. longae tenuissimae; spiculae parvae.

## Subordo II. TRISTEGINAE.

Spiculae semibiflorae. Valvula exterior neutra a glumae valvis structura differt.

### 111. ACRATHERUM.

*Panicula, ramis racemosis. Gluma* bivalvis, valvae carinatae, exterior flosculo sterili brevior, interior flosculo fertili longior. *Glumella hermaphr.* basi pilosa bivalvis, valvulae subaequales, *exterior arista in apice geniculata basi torta. Glumella neutra* bivalvis, valvula ext. major mutica. *Parapetala* 2 truncata subdenticulata. *Stam.* 3. *Styli* 2 superne plumosi.

### 511. A. MILLACEUM.

*Panicula ramis arrectis. Valva* exterior trinervia, interior quinquenervia. Valvulae neutrae laeves. Valvulae fertiles pilis minutis; arista valvam longe superans.

Hab. in Nepalia. 4. C. Caulis 2—3 ped. altus, geniculis pilosis, pilis brevibus adpressis. Folia vagina striata, superne fissurae margine pilis longis; lamina ad basin infra pilis brevibus, supra longis, ceterum scabra ultra 2 lin. lata; ligula brevis. Panicula longa, ramis confertis ad 3 poll. longis; ramulis brevibus, pedicellis 1—2 lin. longis. Spicula 2 lin. et ultra longa. Valva ext. acuta, nervo medio scabro, reliquis scabriusculis; interior lanceolata acutiuscula laevis,

*Glumella neutra bivalvis*, valvula exterior lanceolata subtrinervia laevissima obtusa apice rubens, interior minor intra exteriorem recondita laevis acuta. *Glumella herm. bivalvis* basi pilis cincta, anteriore parte excepta, pilis e duobus fasciculis oriundis; valvula exter. lanceolata obtusiuscula apice arista basi torta fusca intra valvam interiorem recondita, reliqua albente; interior parum minor obtusa subbifida implexa; utraque pilis minutissimis obsita. Antherae longae atropurpureae.

---

## 112. TRISTEGIS.

*Gluma bivalvis*, *valva extima minima*, interior corollae aequalis. *Glumella floris neutrius univalvis*, *valva arista dorsali*. *Glumella floris hermaphroditi bivalvis*, *valvis aequalibus muticis*.

## 512. TR. GLUTINOSA.

Caulis basi ramosus. Folia tota pubescentia. Panicula arcta, bractea setiformis saepe sub pedicello. Valv. cal. interior intermedia et corollinae aequales obtusae, illae nervosae, hae membranaceae; arista valva longior.

Tr. glutinosa *Nees Hor. ber. 47. 54. t. 7. E. a. 1. 71. R. S. m. 2. 203.* *Suardia picta Schrank Hort. Monac? t. 58.* Hab. in Brasilia. 4. C.

---

## ARRHENATHERUM.

## HOLCUS.

## Subordo III. ANTHOXANTHINAE.

*Spiculae subtriflorae. Stam. 2.*

## 113. ANTHOXANTHUM.

*Gluma* bivalvis, valva exterior minor, interior glumellam includens ipsa longior. *Flores neutri 2, univalves, valva exterior arista dorsali, interior arista basilari. Flor. hermaphr. Glumella* bivalvis, *valvae* subaequales *muticae*. Callus sub flor. neutro. Stam. 2.

Ligula elongata. Panicula subspiciformis. Fl. neutri ferruginei.

## 513. A. ODORATUM.

Caulis *non stoloniferus*. Folia cum vaginis glabriuscula margine vix scabra. Valvulae neutrae pilis adpressis; *arista basilaris glumam vix superans*.

A. odoratum *Linn. W. E. 45. E. a. 1. 31. R. S. 1. 287. m. 1. 200. Schreb. gr. 1. 49. t. 5. Host gr. 1. 5. t. 5. Hab. in pratis Europae frequens. ☉. Sponte in horto. Spicula 4 lin. longa.*

## 514. A. AMARUM.

Caulis *stoloniferus*. Folia cum vaginis glabriuscula margine scabra. Valvulae neutrae pilis adpressis; *arista basilaris glumam parum superans*.

A. amarum *Broter Phytagr. t. 5. W. E. S. 3. E. a. 1. 36. R. S. 1. 288. m. 1. 230. Hab. in Lusitania media. 24. F. Majus praecedente, cui simile. Spicula 6 lin. longa et ultra.*

## 515. A. OVATUM.

Caulis basi non stoloniferus. Folia longe ciliata. Valvulae neutrae pilis longis; *arista basilaris glumam longe superans.*

A. ovatum *Lagasc. R. S. 1. 583. m. 1. 230*  
*E. a. 1. 36.* A. gracile *Bivon. R. S. 1. 288. m. 1*  
 230. Hab. in Hispania australi et Sicilia. ☉. D.

---

 PHALARIS.
 

---

## Subordo IV. EHRHARTINAE.

*Spiculae subtriflorae. Stam. 6.*

---

## 114. EHRHARTA.

Panicula effusa, spiculae subtriflorae, flore uno fertili. *Gluma* bivalvis, valvae inaequales ext. minor. *Glumella* exterior univalvis, interior pedicellata univalvis, intima bivalvis, valvula exterior carinata virens, interior carinata membranacea. Parapetala 2 lata apice rotundato. *Stam* 6.

## 516. E. PANICEA.

Panicula ramis arrectis. Valvula glumellae interioris superne transversim undata, omnes muticae.

E. panicea *Smith. ic. ined. 1. 9. t. 9. Willd. sp. 2. 247.* E. erecta *Lam. encycl. 2. 344.* Hab. in Promontorio b. sp. 4. T.

---

## Subordo V. ACTINODEAE.

*Spicae* solitariae seu alternae, *spiculae* subbiflorae, flos alter multiaristatus aut imperfectus arista praesertim evoluta.

---

## 115. CHONDROSIUM.

*Spica solitaria; spiculae unilaterales biseriatae subbiflorae. Gluma* bivalvis. *Floris perfecti glumella* bivalvis, valvula exterior arista sub apice duabusque lateralibus: *Flos imperfectus* pedicellatus rudimentis valvularum aristisque tribus. *Styli* penicillares.

## 517. CH. PROCUMBENS.

Folia convoluta filiformia, ligulae loco pili. Valvae apice subaristatae. Valvulae basi hirtae, exterior arista media valvulae aequali, apice bifido, aristis lateralibus brevioribus.

Ch. procumbens *Desvaux Journ. d. Botan.* 1813.  
 69. *Actinochloa procumbens Willd. herb. R. S.* 2.  
 417. *E. a.* 1. 104. *Atheropogon procumbens Jacq. fil. gr.* 2. t. 12. *Spreng. pug.* 2. 7. *Chloris monostachya W. E. S.* 6. Hab. in insulis Philippinis. ©. D.

---

## 116. ATHEROPOGON.

*Spicae racemosae pauciflorae, spiculae subbiflorae. Gluma* bivalvis, valva exterior duplo minor, interior flosculo perfecto aequalis. *Flos perfectus. Glumella* bivalvis, valvulae subaequales. *Flos imperfectus* saepe pedicellus cum arista simplici aut trifida.

## 518. A. APLUDOIDES.

Spicae 3—4florae secundae. Valvae lanceolatae acutatae scabro-pubescentes. Valvulae lanceolatae longe acutatae, exterior includens.

A. apludoides *Muehlenb. W. E. 1022. E. a. 1. 90. R. S. 2. 413. m. 2. 221.* Chloris cartipendula *Michaux. W. sp. 4. 927.* Eutriana curtispindula *Trin. agr. 161.* Hab. in America boreali praesertim occidentali.

## Sectio VI.

## VILLIFLORAE.

*Spiculae villis involucratae.*

## 117. LAGURUS.

*Panicula* spiciformis, *spiculae uniflorae.* Gluma bivalvis, valvae aequales in aristam longam pennatam abeuntes. Glumella bivalvis, valvula exterior dorso aristata, apice membranaceo bifido, laciniis longe acutatis aristiformibus. Styli subpenicillares.

## 519. L. OVATUS.

Folia dense et molli pubescentia. Thyrsus cylindricus.

L. ovatus *Linn. W. E. 125. E. a. 1. 72. R. S. 2. 401. m. 2. 214. Schreb. gr. 1. 143. t. 19. f. 3. Host gr. 2. t. 46.* Hab. freq. in Europa australi et adjacente Asia. ☉. D.

## 118. IMPERATA.

*Panicula* spiciformis; *spiculae geminae* altera sessilis, altera pedicellata, *utraque semibiflora flosculo hermaphrodito*. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales membranaceae muticae glumella longiores. *Glumella* bivalvis, *valvulae inaequales muticae*. *Glumella* neutra univalvis. *Stam.* 2. *Styl.* 1. stigmata 2 plumosa.

## 520. I. ARUNDINACEA.

Folia *radicalia convoluta* sulcata; caulina lamina brevi nullave. *Thyrus densus, pilis arrectis* spiculis multo longioribus. Valvae dorso longe pilosae.

I. arundinacea *Cyrrill. R. S.* 2. 288. *m.* 2. 165. *E. a.* 1. 65. *Host gr.* 4. *t.* 40. *Lagurus cylindricus Linn. sp.* 1. 120. *Saccharum cylindricum W. E.* 82. Hab. in Europa australiori in siccis arenosis. 4. T.

## 521. I. KOENIGII.

Folia *plana* basi ciliata. *Thyrus laxis, pilis patentibus* spiculis multo longioribus. Valvae dorso longe pilosae.

I. Koenigii *Beauv. R. S.* 2. 289. *Saccharum Koenigii Retz. obs.* 5. 16. *W. E.* 1. 82. Hab. in India orientali. 4. C. Stigmata violacea.

## 119. SACCHARUM.

*Panicula* ramis spicatis; *spiculae geminae aut terna e*, una sessilis, reliquae pedicellatae, *omnet semibiflorae, flosculo hermaphrodito*. *Gluma* bivalvis, valvae subaequales glumella longiores, *Glumella fertilis* bivalvis, *valvulae muti-*

*cae, interior minuta aut obsoleta. Glumella* neutra univalvis. *Styli* 2 semipenicillares, superne purpurascentes. *Parapetala* 2 obtusissima.

522. *S. OFFICINARUM*.

Folia latissima glabra. Panicula elongata. Valvae *ovales breviter acutatae*.

*S. officinarum* *Linn. W. E.* 1. 52. *E. a.* 1. 105. *R. S.* 2. 285. *m.* 2. 160. Hab. in India orientali. 24. C. Valvula fertilis interior obsoleta, quae in *S. aegyptiaco* brevis quidem at evidens membranacea breviter acuta. Valvula neutra compresso-filiformis.

523. *S. VIOLACEUM*.

Caulis violacens. Folia lata glabra. Panicula elongata. Valvae *lineares subnervosae*.

*S. violaceum* *Tussac ant.* 1. 160. *t.* 25. *W. E.* *S.* 5. *E. a.* 1. 105. *R. S.* 2. 285. Colitur in India occidentali et orientali. 24. C. Flores non examinavi.

120. *HETEROPOGON*.

*Spica terminalis* spiculis plerumque *geminis, mascula et feminea. Mas. Spiculae* super. pedicellatae, infim. sessile omnes uniflorae. *Gluma* bivalvis, valvae *subaequales herbaceae. Glumella* univalvis. *Fem. Spicula* sessilis semibiflora. *Gluma* bivalvis, valvula exterior cartilaginea pubescens fusca. *Glumella* neutra univalvis. *Glumella* feminea *valvula* exter. in *aristam longissimam* tortam pubescentem terminata, interior minima aut deficiens. *Styli* 2 semipenicillares. *Stam.* mutila.













































































































































































































































































































